

# 古代经典名方目录

共计 317 方，第一批 100 方。第二批 217 方 其中：汉医 93 方，藏医 34 方、蒙医 34 方、维医 38 方、傣医 18 方。

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第一批	1	桃核承气汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外；外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。”	桃仁五十个(去皮尖)，大黄四两，桂枝二两(去皮)，甘草二两(炙)，芒硝二两。	上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火，微沸下火，先食温服五合，日三服。	汤剂
第一批	2	旋覆代赭汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噎气不除者，属旋覆代赭石汤。”	旋覆花三两，人参二两，生姜五两，代赭一两，甘草三两(炙)，半夏半升(洗)，大枣十二枚(擘)。	上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	3	竹叶石膏汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。”	竹叶二把，石膏一斤，半夏半升(洗)，麦门冬一升(去心)，人参二两，甘草二两(炙)，粳米半斤。	上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟，汤成去米，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	4	麻黄汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“①太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者，麻黄汤主之。②太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当复发汗。服汤已，微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也，宜麻黄汤。③脉浮而紧，浮则为风，紧则为寒，风则伤卫，寒则伤荣，荣卫俱病，骨节烦疼，可发其汗，宜麻黄汤。”	麻黄三两(去节)，桂枝二两(去皮)，甘草一两(炙)，杏仁七十个(去皮尖)。	上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。	汤剂
第一批	5	吴茱萸汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“①食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。②干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。”	吴茱萸一升(洗)，人参三两，生姜六两(切)，大枣十二枚(擘)。	上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。	汤剂
第一批	6	芍药甘草汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急。……若厥愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸。”	白芍药、甘草各四两(炙)。	上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。	汤剂
第一批	7	半夏泻心汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。”	半夏半升(洗)，黄芩、干姜、人参、甘草(炙)各三两，黄连一两，大枣十二枚(擘)。	上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	8	真武汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“①太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。②少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。”	茯苓、芍药、生姜(切)各三两，白术二两，附子一枚(炮，去皮，破八片)。	上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。	汤剂
第一批	9	猪苓汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“①若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。②少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。”	猪苓(去皮)、茯苓、泽泻、阿胶、滑石(碎)各一两。	上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，内阿胶烊消，温服七合，日三服。	汤剂
第一批	10	小承气汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“①阳明病脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲	大黄四两(酒洗)，厚朴二两(炙，去皮)，枳实三枚(大者，炙)。	上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤当更衣，不尔者，	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			解，可攻里也。手足濇然而汗出者，此大便已鞣也，大承气汤主之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤。若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令至大泄下。②下利谵语者，有燥屎也，宜小承气汤。③若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎也，乃可攻之。若不转矢气者，此但初头鞣，后必溏，不可攻之，攻之必胀满，不能食也，欲饮水者，与水则哕。其后发热者，大便必复鞣而少也，以小承气汤和之。不转矢气者，慎不可攻也。”		尽饮之，若更衣者，勿服之。	
第一批	11	甘草泻心汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞鞣而满，干呕心烦不得安，医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使鞣也，属甘草泻心汤。”	甘草四两（炙），黄芩三两，干姜三两，大枣十二枚（擘），半夏半升（洗），黄连一两。	上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	12	黄连汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。”	黄连三两，甘草三两（炙），干姜三两，桂枝三两（去皮），人参二两，半夏半升（洗），大枣十二枚（擘）。	上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服，昼三服夜二服。	汤剂
第一批	13	当归四逆汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“①手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。②下利脉大者，虚也，以强下之故也。设脉浮革，因尔肠鸣者，属当归四逆汤。”	当归三两，桂枝三两（去皮），芍药三两，细辛三两，甘草二两（炙），通草二两，大枣二十五枚（擘）。	上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	14	附子汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。”	附子二枚（炮，去皮，破八片），茯苓三两，人参二两，白术四两，芍药三两。	上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	15	桂枝芍药知母汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。”	桂枝四两，芍药三两，甘草二两，麻黄二两，生姜五两，白术五两，知母四两，防风四两，附子二两（炮）。	上九味，以水七升，煮取二升，温服七合，日三服。	汤剂
第一批	16	黄芪桂枝五物汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。”	黄芪三两，芍药三两，桂枝三两，生姜六两，大枣十二枚。	上五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日三服。	汤剂
第一批	17	半夏厚朴汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。”	半夏一升，厚朴三两，茯苓四两，生姜五两，干苏叶二两。	上五味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。	汤剂
第一批	18	瓜蒌薤白半夏汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“胸痹不得卧，心痛彻背者，瓜蒌薤白半夏汤主之。”	瓜蒌实一枚，薤白三两，半夏半斤，白酒一斗。	上四味，同煮，取四升，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	19	苓桂术甘汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“①心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。②夫短气有微饮，当从小便去之，苓桂术甘汤主之。”	茯苓四两，桂枝、白术各三两，甘草二两。	上四味，以水六升，煮取三升，分温三服。	汤剂
第一批	20	泽泻汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“心下有支饮，其人苦冒眩，泽泻汤主之。”	泽泻五两，白术二两。	上二味，以水二升，煮取一升，分温再服。	汤剂
第一批	21	百合地黄汤	《金匱要略》（汉·张仲景）“百合病，不经吐、下、	百合七枚（擘），生地黄汁一升。	上以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			发汗，病形如初者，百合地黄汤主之。”		其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，内地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病，勿更服，大便当如漆。	
第一批	22	枳实薤白桂枝汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“胸痹心中痞，留气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之。”	枳实四枚，厚朴四两，薤白半斤，桂枝一两，瓜蒌实一枚（捣）。	上五味，以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓，内诸药，煮数沸，分温三服。	汤剂
第一批	23	大建中汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“心胸中大寒痛，呕不能饮食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近，大建中汤主之。”	蜀椒二合（去汗），干姜四两，人参二两。	上三味，以水四升，煮取二升，去滓，内胶饴一升，微火煮取一升半，分温再服；如一炊顷，可饮粥二升，后更服。当一日食糜，温覆之。	汤剂
第一批	24	橘皮竹茹汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“哕逆者，橘皮竹茹汤主之。”	橘皮二升，竹茹二升，大枣三十枚，生姜半斤，甘草五两，人参一两。	上六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	25	麦门冬汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之。”	麦门冬七升，半夏一升，人参二两，甘草二两，粳米三合，大枣十二枚。	上六味，以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三夜一服。	汤剂
第一批	26	甘姜苓术汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“肾著之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦。身劳汗出，衣里冷湿，久久得之，腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘姜苓术汤主之。”	甘草、白术各二两，干姜、茯苓各四两。	上四味，以水五升，煮取三升，分温三服。	汤剂
第一批	27	厚朴七物汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故，厚朴七物汤主之。”	厚朴半斤，甘草、大黄各三两，大枣十枚，枳实五枚，桂枝二两，生姜五两。	上七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。	汤剂
第一批	28	厚朴麻黄汤	《金匮要略》（汉·张仲景）“咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之。”	厚朴五两，麻黄四两，石膏如鸡子大，杏仁半升，半夏半升，干姜二两，细辛二两，小麦一升，五味子半升。	上九味，以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，内诸药，煮取三升，温服一升，日三服。	汤剂
第一批	29	当归建中汤	《千金翼方》（唐·孙思邈）“治产后虚羸不足，腹中疾痛不止，吸吸少气，或若小腹拘急挛痛引腰背，不能饮食，产后一月，日得服四五剂为善，令人强壮内补方。”	当归四两，桂心三两，甘草二两（炙），芍药六两，生姜三两，大枣十二枚（擘）。	右六味，咬咀，以水一斗，煮取三升，分为三服，一日令尽。	汤剂
第一批	30	温脾汤	《备急千金要方》（唐·孙思邈）“治下久赤白连年不止，及霍乱，脾胃冷，实不消。”	大黄四两，人参、甘草、干姜各二两，附子一枚（大者）。	右五味，咬咀，以水八升煮取二升半，分三服。临熟下大黄。	汤剂
第一批	31	温胆汤	《备急千金要方》（唐·孙思邈）“治大病后，虚烦不得眠，此胆寒故也，宜服温胆汤。”	半夏、竹茹、枳实各二两，橘皮三两，生姜四两，甘草一两。	右六味，咬咀，以水八升煮取二升，分三服。	汤剂
第一批	32	小续命汤	《备急千金要方》（唐·孙思邈）“治卒中风欲死，身体缓急，口目不正，舌强不能语，奄奄忽忽，神情闷乱，诸风服之皆验，不令人虚方。”	麻黄、防己、人参、黄芩、桂心、甘草、芍药、川芎、杏仁各一两，附子一枚，防风一两半，生姜五两。	右十二味，咬咀，以水一斗二升，先煮麻黄三沸，去沫，内诸药，煮取三升。分三服，甚良。不瘥，更合三、四剂，必佳。	汤剂
第一批	33	开心散	《备急千金要方》（唐·孙思邈）“开心散，主好忘方。”	远志、人参各四分，茯苓二两，菖蒲一两。	右四味治下筛，饮服方寸匕，日三。	散剂
第一批	34	槐花散	《普济本事方》（宋·许叔微）“治肠风脏毒，槐花散。”	槐花（炒），柏叶（烂杵焙），荆芥穗，枳壳（去穰细切，麸炒黄）。	右修事了，方秤等分，细末，用清米饮调下二钱，空心食前服。	散剂
第一批	35	竹茹汤	《普济本事方》（宋·许叔微）“治胃热呕吐，竹茹汤。”	干葛三两，甘草三分（炙），半夏三分（姜汁半盏，浆水一升煮耗半）。	右粗末，每服五钱，水二盏，生姜三片，竹茹一弹大，枣一个，同煎至一盏，去滓温服。	煮散

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第一批	36	辛夷散	《严氏济生方》（宋·严用和）“治肺虚，风寒湿热之气加之，鼻内壅塞，涕出不已，或气息不通，或不闻香臭。”	辛夷仁、细辛（洗去土、叶）、藁本（去芦）、升麻、川芎、木通（去节）、防风（去芦）、羌活（去芦）、甘草（炙）、白芷各等分。	右为细末，每服二钱。食后茶清调服。	散剂
第一批	37	当归饮子	《严氏济生方》（宋·严用和）“治心血凝滞，内蕴风热，发见皮肤，遍身疮疥，或肿或痒，或脓水浸淫，或发赤疹痞瘤。”	当归（去芦）、白芍药、川芎、生地黄（洗）、白蒺藜（炒，去尖）、防风（去芦）、荆芥穗各一两，何首乌、黄芪（去芦），甘草（炙）各半两。	右咬咀，每服四钱，水一盞半，姜五片，煎至八分，去滓温服。不拘时候。	煮散
第一批	38	实脾散	《严氏济生方》（宋·严用和）“治阴水，先实脾土。”	厚朴（去皮，姜制，炒）、白术、木瓜（去瓤）、木香（不见火）、草果仁、大腹子、附子（炮，去皮脐）、白茯苓（去皮）、干姜（炮）各一两，甘草（炙）半两。	右咬咀，每服四钱，水一盞半，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。	煮散
第一批	39	温经汤	《妇人大全良方》（宋·陈自明）“若经道不通，绕脐寒疝痛彻，其脉沉紧。此由寒气客于血室，血凝不行，结积血为气所冲，新血与故血相搏，所以发痛。譬如天寒地冻，水凝成冰。宜温经汤及桂枝桃仁汤、万病丸。”	当归、川芎、芍药、桂心、牡丹皮、莪术各半两，人参、甘草、牛膝各一两。	右咬咀，每服五钱。水一盞半，煎至八分，去滓温服。	煮散
第一批	40	泻白散	《小儿药证直诀》（宋·钱乙）“治小儿肺盛，气急喘嗽。”	地骨皮（洗去土，焙）、桑白皮（细锉炒黄）各一两，甘草（炙）一钱。	上锉散，入粳米一撮，水二小盞，煎七分，食前服。	煮散
第一批	41	清心莲子饮	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治心中蓄积，时常烦躁，因而思虑劳力，忧愁抑郁，是致小便白浊，或有沙膜，夜梦走泄，遗沥涩痛，便赤如血；或因酒色过度，上盛下虚，心火炎上，肺金受克，口舌干燥，渐成消渴，睡卧不安，四肢倦怠，男子五淋，妇人带下赤白；及病后气不收斂，阳浮于外，五心烦热。药性温平，不冷不热，常服清心养神，秘精补虚，滋润肠胃，调顺血气。”	黄芩、麦门冬（去心）、地骨皮、车前子、甘草（炙）各半两，石莲肉（去心）、白茯苓、黄芪（蜜炙）、人参各七钱半。	右剉散。每三钱，麦门冬十粒，水一盞半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空心，食前服。	煮散
第一批	42	甘露饮	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治丈夫、妇人、小儿胃中客热，牙宣口气，齿龈肿烂，时出脓血，目眦垂重，常欲合闭；或频饥烦，不欲饮食，及赤目肿痛，不任凉药，口舌生疮，咽喉肿痛，疮疹已发、未发，皆可服之。又疔脾胃受湿，瘀热在里，或醉饱房劳，湿热相搏，致生疸病，身面皆黄，肢体微肿，胸满气短，大便不调，小便黄涩，或时身热，并皆治之。”	枇杷叶（刷去毛）、干熟地黄（去土）、天门冬（去心，焙）、枳壳（去瓤，麸炒）、山茵陈（去梗）、生干地黄、麦门冬（去心，焙）、石斛（去芦）、甘草（炙）、黄芩。	右等分，为末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓温服，食后，临卧。小儿一服分两服，仍量岁数加减与之。	煮散
第一批	43	华盖散	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞，头昏目眩，痰气不利，呀呷有声。”	紫苏子（炒）、赤茯苓（去皮）、桑白皮（炙）、陈皮（去白）、杏仁（去皮、尖，炒）、麻黄（去根、节）各一两，甘草（炙）半两。	右七味为末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服。	煮散
第一批	44	三痹汤	《妇人大全良方》（宋·陈自明）“治血气凝滞，手足拘挛，风痹，气痹等疾皆疗。”	川续断、杜仲（去皮，切，姜汁炒）、防风、桂心、细辛、人参、茯苓、当归、白芍药、甘草各一两，秦艽、生地黄、川芎、川独活各半两，黄芪、川牛膝各一两。	右咬咀为末，每服五钱。水二盞，姜三片，枣一枚，煎至一盞，去滓热服，无时候，但腹稍空腹。	煮散
第一批	45	升阳益胃汤	《脾胃论》（金·李东垣）“脾胃之虚，怠惰嗜卧，四	黄芪二两，半夏（汤洗）、人参（去芦）、	上咬咀，每服三钱，生姜五片，枣二枚，	煮散

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			肢不收，时值秋燥令行，湿热少退，体重节痛，口苦舌干，食无味，大便不调，小便频数，不嗜食，食不消。兼见肺病，酒渐恶寒，惨惨不乐，面色恶而不和，乃阳气不伸故也。当升阳益胃，名之曰升阳益胃汤。”	甘草（炙）各一两，防风、白芍药、羌活、独活各五钱，橘皮（连穰）四钱，茯苓、泽泻、柴胡、白术各三钱，黄连二钱。	去核，水三盏，同煎至一盏，去渣，温服，早饭、午饭之间服之，禁忌如前。其药渐加至五钱止。	
第一批	46	清胃散	《兰室秘藏》（金·李东垣）“治因服补胃热药，致使上下牙疼痛不可忍，牵引头脑、满面发热，大痛。足阳明之别络入脑，喜寒恶热，乃是手足阳明经中热盛而作也。其齿喜冷恶热。”	当归身、择细黄连、生地黄（酒制）各三分，牡丹皮五分，升麻一钱。	上为细末，都作一服，水一盏半，煎至一盏，去滓，带冷服之。	煮散
第一批	47	当归六黄汤	《兰室秘藏》（金·李东垣）“治盗汗之圣药也。”	当归、生地黄、熟地黄、黄柏、黄芩、黄连各等分，黄芪加一倍。	上为粗末，每服五钱，水二盏，煎至一盏，食前服。小儿减半服之。	煮散
第一批	48	圣愈汤	《兰室秘藏》（金·李东垣）“治诸恶疮，血出多而心烦不安，不得睡眠，亡血故也，以此药主之。”	生地黄、熟地黄、川芎、人参各三分，当归身、黄芪各五分。	上咬咀，如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热无时服。	煮散
第一批	49	乌药汤	《兰室秘藏》（金·李东垣）“治妇人血海疼痛。”	当归、甘草、木香各五钱，乌药一两，香附子二两（炒）。	上咬咀，每服五钱，水二大盏，去滓，温服，食前。	煮散
第一批	50	羌活胜湿汤	《内外伤辨惑论》（金·李东垣）“肩背痛不可回顾者，此手太阳气郁而不行，以风药散之。脊痛项强，腰似折，项似拔，此足太阳经不通行，以羌活胜湿汤主之。”	羌活、独活各一钱，藁本、防风、甘草（炙）、川芎各五分，蔓荆子三分。	上咬咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去渣，大温服，空心食前。	煮散
第一批	51	当归补血汤	《内外伤辨惑论》（金·李东垣）“治肌热，燥热，困渴引饮，目赤面红，昼夜不息。其脉洪大而虚，重按全无。”	黄芪一两，当归二钱（酒洗）。	上件咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去渣，温服，空心食前。	煮散
第一批	52	厚朴温中汤	《内外伤辨惑论》（金·李东垣）“治脾胃虚寒，心腹胀满，及秋冬客寒犯胃，时作疼痛。”	厚朴（姜制）、橘皮（去白）各一两，甘草（炙）、草豆蔻仁、茯苓（去皮）、木香各五钱，干姜七分。	上为粗散，每服五钱匕。水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，温服，食前。忌一切冷物。	煮散
第一批	53	地黄饮子	《黄帝素问宣明论方》（金·刘完素）“暗痺证，主肾虚。内夺而厥，舌暗不能言，二足废不为用。肾脉虚弱，其气厥不至，舌不仁。经云：暗痺，足不履用，音声不出者。地黄饮子主之，治暗痺，肾虚弱厥逆，语声不出，足废不用。”	熟干地黄、巴戟（去心）、山茱萸、石斛、肉苁蓉（酒浸，焙）、附子（炮）、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬（去心）、菖蒲、远志（去心）各等分。	右为末，每服三钱，水一盏半，生姜五片，枣一枚，薄荷，同煎至八分，不计时候。	煮散
第一批	54	大秦芩汤	《素问病机气宜保命集》（金·刘完素）“中风，外无六经之形证，内无便溺之阻格，知血弱不能养筋，故手足不能运动，舌强不能言语，宜养血而筋自荣，大秦芩汤主之。”	秦艽三两，甘草二两，川芎二两，当归二两，白芍药二两，细辛半两，川羌活、防风、黄芩各一两，石膏二两，吴白芷一两，白术一两，生地黄一两，熟地黄一两，白茯苓一两，川独活二两。	右十六味，剉，每服一两，水煎，去渣，温服，无时。	煮散
第一批	55	三化汤	《素问病机气宜保命集》（金·刘完素）“中风外有六经之形证，先以加减续命汤，随证治之，内有便溺之阻格，复以三化汤主之。”	厚朴、大黄、枳实、羌活各等分。	右剉如麻豆大，每服三两，水三升，煎至一升半，终日服之。以微利为度，无时。	汤剂
第一批	56	清金化痰汤	《医学统旨》（明·叶文龄）“清金化痰汤，因火者，咽喉干痛，面赤，鼻出热气，其痰嗽而难出，色黄且浓，或带血丝，或出腥臭。”	黄芩、山栀各一钱半，桔梗二钱，麦门冬（去心）、桑皮、贝母、知母、瓜蒌仁（炒）、橘红、茯苓各一钱，甘草四分。	水二盅，煎八分，食后服。	汤剂
第一批	57	桑白皮汤	《景岳全书》（明·张景岳）“治肺气有余，火炎痰盛	桑白皮、半夏、苏子、杏仁、贝母、山栀、	水二盅，姜三片，煎八分，温服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			作喘。”	黄芩、黄连各八分。		
第一批	58	金水六君煎	《景岳全书》（明·张景岳）“治肺肾虚寒，水泛为痰，或年迈阴虚，血气不足，外受风寒，咳嗽呕恶，多痰喘急等证。”	当归二钱，熟地三、五钱，陈皮一钱半，半夏二钱，茯苓二钱，炙甘草一钱。	水二盅，生姜三、五、七片，煎七、八分，食远温服。	汤剂
第一批	59	暖肝煎	《景岳全书》（明·张景岳）“治肝肾阴寒，小腹疼痛，疝气等证。”	当归二、三钱，枸杞三钱，茯苓二钱，小茴香二钱，肉桂一、二钱，乌药二钱，沉香一钱或木香亦可。	水一盅半，加生姜三、五片，煎七分，食远温服。	汤剂
第一批	60	玉女煎	《景岳全书》（明·张景岳）“治水亏火盛，六脉浮洪滑大，少阴不足，阳明有余，烦热干渴，头痛牙疼，失血等证。若大便溏泄者，乃非所宜。”	生石膏三、五钱，熟地三、五钱或一两，麦冬二钱，知母、牛膝各一钱半。	水一盅半，煎七分，温服或冷服。	汤剂
第一批	61	保阴煎	《景岳全书》（明·张景岳）“治男妇带浊遗淋，色赤带血，脉滑多热，便血不止，及血崩血淋，或经期太早，凡一切阴虚内热动血等证。”	生地、熟地、芍药各二钱，山药、川续断、黄芩、黄柏各一钱半，生甘草一钱。	水二盅，煎七分。食远温服。	汤剂
第一批	62	化肝煎	《景岳全书》（明·张景岳）“治怒气伤肝，因而气逆动火，致为烦热胁痛，胀满动血等证。”	青皮、陈皮各二钱，芍药二钱，丹皮、栀子（炒）、泽泻各一钱半，土贝母二、三钱。	水一盅半，煎七、八分。食远温服。	汤剂
第一批	63	济川煎	《景岳全书》（明·张景岳）“凡病涉虚损，而大便闭结不通，则硝、黄攻击等剂必不可用，若势有不得不通者，宜此主之。”	当归三、五钱，牛膝二钱，肉苁蓉（酒洗去咸）二、三钱，泽泻一钱半，升麻五分、七分或一钱，枳壳一钱。	水一盅半，煎七八分，食前服。	汤剂
第一批	64	固阴煎	《景岳全书》（明·张景岳）“治阴虚滑泄，带浊淋遗，及经水因虚不固等证。此方专主肝肾。”	人参随宜，熟地三、五钱，山药二钱（炒），山茱萸一钱半，远志七分（炒），炙甘草一、二钱，五味子十四粒，菟丝子二、三钱（炒香）。	水二盅，煎七分，食远温服。	汤剂
第一批	65	托里消毒散	《外科正宗》（明·陈实功）“治痈疽已成不得内消者，宜服此药以托之，未成者可消，已成者即溃，腐肉易去，新肉易生，此时不可用内消泄气、寒凉等药致伤脾胃为要。”	人参、川芎、白芍、黄芪、当归、白术、茯苓、金银花各一钱，白芷、甘草、皂角针、桔梗各五分。	水二盅，煎八分，食远服。	汤剂
第一批	66	清上蠲痛汤	《寿世保元》（明·龚廷贤）“论一切头痛主方，不论左右偏正新久，皆效。”	当归一钱（酒洗），小川芎一钱，白芷一钱，细辛三分，羌活一钱，独活一钱，防风一钱，菊花五分，蔓荆子五分，苍术一钱（米泔浸），片苓一钱五分（酒炒），麦门冬一钱，甘草三分（生）。	上锉一剂，生姜煎服。	煮散
第一批	67	清肺汤	《万病回春》（明·龚廷贤）“治一切咳嗽，上焦痰盛。”	黄芩（去朽心）一钱半，桔梗（去芦）、茯苓（去皮）、陈皮（去白）、贝母（去心）、桑白皮各一钱，当归、天门冬（去心）、山栀、杏仁（去皮尖）、麦门冬（去心）各七分，五味子七粒，甘草三分。	上锉，生姜、枣子煎，食后服。	煮散
第一批	68	养胃汤	《证治准绳》（明·王肯堂）“治外感风寒，内伤生冷，憎寒壮热，头目昏疼，不问风寒二证，夹食停痰，俱能治之，但感风邪，以微汗为好。”	半夏（汤洗七次）、厚朴（去粗皮、姜汁炒）、苍术（米泔浸一宿，洗切，炒）各一两，橘红七钱半，藿香叶（洗去土）、草果（去皮	右咬咀，每服四钱，水一盅半，姜七片，乌梅一个，煎六分，热服。	煮散

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
				膜)、茯苓(去黑皮)、人参(去芦)各半两,炙甘草二钱半。		
第一批	69	清骨散	《证治准绳》(明·王肯堂)“专退骨蒸劳热。”	银柴胡一钱五分,胡黄连、秦艽、鳖甲(醋炙)、地骨皮、青蒿、知母各一钱,甘草五分。	水二盅,煎八分,食远服。	汤剂
第一批	70	石决明散	《普济方》(明·朱橚)“石决明散,治风毒气攻入头系眼昏暗,及头目不利。”	石决明、羌活(去芦头)、草决明、菊花各一两,甘草(炙,剉)半两。	右为散,每服二钱,以水一盞。煎六分,和滓,食后、临卧温服。	煮散
第一批	71	保元汤	《简明医彀》(明·孙志宏)“治元气虚弱,精神倦怠,肌肉柔慢,饮食少进,面青皓白,睡卧宁静,……及有杂证,皆属虚弱,宜服。”	人参一钱,黄芪二钱,甘草五分,肉桂二分。	右加生姜一片,水煎服。	汤剂
第一批	72	达原饮	《瘟疫论》(明·吴又可)“瘟疫初起先憎寒而后发热,日后但热而无憎寒也,初起二三日,其脉不浮不沉而数,昼夜发热,日晡益甚,头疼身痛,其时邪在伏脊之前,肠胃之后。虽有头疼身痛,此邪热浮越于经,不可认为伤寒表证,辄用麻黄、桂枝之类强发其汗。此邪不在经,汗之徒伤表气,热亦不减。又不可下,此邪不在里,下之徒伤胃气,其渴愈甚。宜达原饮。”	槟榔二钱,厚朴一钱,草果仁五分,知母一钱,芍药一钱,黄芩一钱,甘草五分。	右用水一盅,煎八分,午后温服。	汤剂
第一批	73	升陷汤	《医学衷中参西录》(清·张锡纯)“治胸中大气下陷,气短不足以息……”	生黄芪六钱,知母三钱,柴胡一钱五分,桔梗一钱五分,升麻一钱。	水煎服。	汤剂
第一批	74	三甲复脉汤	《温病条辨》(清·吴瑭)“①下焦温病,热深厥甚,脉细促,心中憺憺大动,甚则心中痛者,三甲复脉汤主之。②燥久伤及肝肾之阴,上盛下虚,昼凉夜热,或干咳,或不咳,甚则痉厥者,三甲复脉汤主之。”	炙甘草六钱,干地黄六钱,生白芍六钱,麦冬五钱(不去心),阿胶三钱,麻仁三钱,生牡蛎五钱,生鳖甲八钱,生龟板一两。	水八杯,煮取八分三杯,分三次服。	汤剂
第一批	75	沙参麦冬汤	《温病条辨》(清·吴瑭)“燥伤肺胃阴分,或热或咳者,沙参麦冬汤主之。”	沙参三钱,玉竹二钱,生甘草一钱,冬桑叶一钱五分,麦冬三钱,生扁豆一钱五分,花粉一钱五分。	水五杯,煮取二杯,日再服。	汤剂
第一批	76	新加香薷饮	《温病条辨》(清·吴瑭)“手太阴暑温,如上条证,但汗不出者,新加香薷饮主之。”	香薷二钱,银花三钱,鲜扁豆花三钱,厚朴二钱,连翘二钱。	水五杯,煮取二杯,先服一杯,得汗止后服,不汗再服,服尽不汗,再作服。	汤剂
第一批	77	桑杏汤	《温病条辨》(清·吴瑭)“秋感燥气,右脉数大,伤手太阴气分者,桑杏汤主之。”	桑叶一钱,杏仁一钱五分,沙参二钱,象贝一钱,香豉一钱,栀皮一钱,梨皮一钱。	水二杯,煮取一杯,顿服之,重者再作服。	汤剂
第一批	78	益胃汤	《温病条辨》(清·吴瑭)“阳明温病,下后汗出,当复其阴,益胃汤主之。”	沙参三钱,麦冬五钱,冰糖一钱,细生地五钱,玉竹一钱五分(炒香)。	水五杯,煮取二杯,分二次服,渣再煮一杯服。	汤剂
第一批	79	蠲痹汤	《医学心悟》(清·程国彭)“通治风、寒、湿三气,合而成痹。”	羌活、独活各一钱,桂心五分,秦艽一钱,当归三钱,川芎七分,甘草五分(炙),海风藤二钱,桑枝三钱,乳香、木香各八分。	水煎服。	汤剂
第一批	80	二冬汤	《医学心悟》(清·程国彭)“治上消者,宜润其肺,兼清其胃,二冬汤主之。”	天冬二钱(去心),麦冬三钱(去心),花粉一钱,黄芩一钱,知母一钱,甘草五分,人参五分,荷叶一钱。	水煎服。	汤剂
第一批	81	半夏白术天麻	《医学心悟》(清·程国彭)“眩,谓眼黑;晕者,头	半夏一钱五分,天麻、茯苓、橘红各一钱,	生姜一片,大枣二枚,水煎服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
		汤	旋也。……有湿痰壅遏者，书云，头旋眼花，非天麻、半夏不除是也，半夏白术天麻汤主之。”	白术三钱，甘草五分。		
第一批	82	藿朴夏苓汤	《医原》（清·石寿棠）“湿之化气，为阴中之阳，氤氲浊腻，故兼证最多，变迁最幻，愈期最缓。其见证也，面色混浊如油腻，口气浊腻不知味，或生甜水，舌苔白腻，膜原邪重则舌苔满布，厚如积粉，板贴不松，脉息模糊不清，或沉细似伏，断续不匀，神多沉困嗜睡。斯时也，邪在气分，即当分别湿多热多。”	杜藿香二钱，真川朴一钱，姜半夏钱半，赤苓三钱，光杏仁三钱，生薏仁四钱，白蔻末六分，猪苓钱半，淡香豉三钱，建泽泻钱半。	选用丝通草三钱，或五钱煎汤代水，煎上药服。	汤剂
第一批	83	丁香柿蒂散	《伤寒瘟疫条辨》（清·杨栗山）“治久病呃逆，因下寒者。”	丁香、柿蒂各二钱，人参一钱，生姜三钱。	水煎温服。	汤剂
第一批	84	一贯煎	《医方聚度》（清·钱敏捷）“一贯煎（柳洲）主肝血衰少，脘痛，胁疼。”	北沙参、麦冬、当归各一钱五分，枸杞、生地各三钱，川楝子二钱。	水煎服。	汤剂
第一批	85	易黄汤	《傅青主女科》（清·傅山）“妇人有带下而色黄者，宛如黄茶浓汁，其气腥秽，所谓黄带是也。……法宜补任脉之虚，而清肾火之炎，则庶几矣。方用易黄汤。”	山药一两（炒），芡实一两（炒），黄柏二钱（盐水炒），车前子一钱（酒炒），白果十枚（碎）。	水煎服。	汤剂
第一批	86	宣郁通经汤	《傅青主女科》（清·傅山）“妇人经前腹痛数日，而后经水行者，其经来多是紫黑块，人以为寒极而然也，谁知是热极而火不化乎！……治法似宜大泄肝中之火，然泄肝之火，而不解肝之郁，则热之标可去，而热之本未除也，其何能益！方用宣郁通经汤。”	白芍五钱（酒炒），当归五钱（酒洗），丹皮五钱，山栀子三钱（炒），白芥子二钱（炒研），柴胡一钱，香附一钱（酒炒），川郁金一钱（醋炒），黄芩一钱（酒炒），生甘草一钱。	水煎服。	汤剂
第一批	87	完带汤	《傅青主女科》（清·傅山）“妇人有终年累月下流白物，如涕如唾，不能禁止，甚则臭秽者，所谓白带也。……治法宜大补脾胃之气，稍佐以舒肝之品，使风木不闭塞于地中，则地气自升腾于天上，脾气健而湿气消，自无白带之患矣。方用完带汤。”	白术一两（土炒），山药一两（炒），人参二钱，白芍五钱（酒炒），车前子三钱（酒炒），苍术三钱（制），甘草一钱，陈皮五分，黑芥穗五分，柴胡六分。	水煎服。	汤剂
第一批	88	清经散	《傅青主女科》（清·傅山）“妇人先期经来者，其经甚多，人以为血热之极也，谁知是肾中水火太旺乎。……治之法但少清其热，不必泄其水也。方用清经散。”	丹皮三钱，地骨皮五钱，白芍三钱（酒炒），大熟地三钱（九蒸），青蒿二钱，白茯苓一钱，黄柏五分（盐水浸，炒）。	水煎服。	汤剂
第一批	89	清肝止淋汤	《傅青主女科》（清·傅山）“妇人有带下而色红者，似血非血，淋漓不断，所谓赤带也。……治法须清肝火而扶脾气，则庶几可愈。方用清肝止淋汤。”	白芍一两（醋炒），当归一两（酒洗），生地五钱（酒炒），阿胶三钱（白面炒），粉丹皮三钱，黄柏二钱，牛膝二钱，香附一钱（酒炒），红枣十个，小黑豆一两。	水煎服。	汤剂
第一批	90	两地汤	《傅青主女科》（清·傅山）“又有先期经来只一、二点者，人以为血热之极也，谁知肾中火旺而阴水亏乎。……治之法不必泄火，只专补水，水既足而火自消矣，亦既济之道也。方用两地汤。”	大生地一两（酒炒），元参一两，白芍药五钱（酒炒），麦冬肉五钱，地骨皮三钱，阿胶三钱。	水煎服。	汤剂
第一批	91	四妙勇安汤	《验方新编》（清·鲍相璈）“此症生手、足各指，或生指头，或生指节、指缝。初生或白色痛极，或如粟米起一黄泡。其皮或如煮熟红枣，黑色不退，久则溃烂，节节脱落，延至手足背腐烂黑陷，痛不可忍。……宜用	金银花、元参各三两，当归二两，甘草一两。	水煎服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			顶大甘草，研极细末，用香麻油调敷。……再用金银花、元参各三两，当归二两，甘草一两，水煎服。”			
第一批	92	身痛逐瘀汤	《医林改错》（清·王清任）“凡肩痛、臂痛、腰痛、腿痛，或周身疼痛，总名曰痹症。明知受风寒，用温热发散药不愈；明知有湿热，用利湿降火药无功。久而肌肉消瘦，议论阴亏，随用滋阴药又不效。至此便云：病在皮脉，易于为功；病在筋骨，实难见效。因不思风寒湿热入皮肤，何处作痛。入于气管，痛必流走；入于血管，痛不移处。如论虚弱，是因病而致虚，非因虚而致病。……古方颇多，如古方治之不效，用身痛逐瘀汤。”	秦艽一钱，川芎二钱，桃仁三钱，红花三钱，甘草二钱，羌活一钱，没药二钱，当归三钱，灵脂二钱（炒），香附一钱，牛膝三钱，地龙二钱（去土）。	水煎服。	汤剂
第一批	93	除湿胃苓汤	《医宗金鉴》（清·吴谦）“此证俗名蛇串疮，有干湿不同，红黄之异，皆如累累珠形。……湿者色黄白，水疱大小不等，作烂流水，较干者多疼，此属脾肺二经湿热，治宜除湿胃苓汤。”	苍术（炒）、厚朴（姜炒）、陈皮、猪苓、泽泻、赤茯苓、白术（土炒）、滑石、防风、山栀子（生，研）、木通各一钱，肉桂、甘草（生）各三分。	水二盅，灯心五十寸，煎八分，食前服。	汤剂
第一批	94	枇杷清肺饮	《医宗金鉴》（清·吴谦）“此证由肺经血热而成。每发于面鼻，起碎疙瘩，形如黍屑，色赤肿痛，破出白粉汁，日久皆成白屑，形如黍米白屑。宜内服枇杷清肺饮。”	人参三分，枇杷叶二钱（刷去毛，蜜炙），甘草三分（生），黄连一钱，桑白皮二钱（鲜者佳），黄柏一钱。	水一盅半，煎七分，食远服。	汤剂
第一批	95	黄连膏	《医宗金鉴》（清·吴谦）“此证生于鼻窍内，初觉干燥疼痛，状如粟粒，甚则鼻外色红微肿，痛似火炙。由肺经壅热，上攻鼻窍，聚而不散，致成此疮。内宜黄芩汤清之，外用油纸捻粘辰砂定痛散，送入鼻孔内。若干燥者，黄连膏抹之立效。”	黄连三钱，当归尾五钱，生地一两，黄柏三钱，姜黄三钱。	香油十二两，将药燥枯，捞去渣；下黄蜡四两溶化尽，用夏布将油滤净，倾入磁碗内，以柳枝不时搅之，候凝为度。	膏剂
第一批	96	五味消毒饮	《医宗金鉴》（清·吴谦）“夫疔疮者，乃火证也。……初起俱宜服蟾酥丸汗之；毒势不尽，憎寒壮热仍作者，宜服五味消毒饮汗之。”	金银花三钱，野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子各一钱二分。	水二盅，煎八分，加无灰酒半钟，再滚二、三沸时，热服。渣，如法再煎服，被盖出汗为度。	汤剂
第一批	97	桃红四物汤	《妇科冰鉴》（清·柴得华）“血多有块，色紫稠粘者，有瘀停也，桃红四物汤随其流以逐之。”	生地三钱（酒洗），当归四钱（酒洗），白芍钱五分（酒炒），川芎一钱，桃仁十四粒（去皮尖研泥），红花一钱（酒洗）。	水煎温服。	汤剂
第一批	98	散偏汤	《辨证录》（清·陈士铎）“人有患半边头风者，或痛在右，或痛在左，大约痛于左者为多，百药治之罔效，人不知其故。此病得之郁气不宣，又加风邪袭之于少阳之经，遂致半边头痛也。其病有时重有时轻，大约遇顺境则痛轻，遇逆境则痛重，遇拂抑之事而更加之风寒之天，则大痛而不能出户。痛至岁久，则眼必缩小，十年之后，必至坏目，而不可救药矣。治法急宜解其肝胆之郁气。虽风入于少阳之胆，似乎解郁宜解其胆，然而胆与肝为表里，治胆者必须治肝。况郁气先伤肝而后伤胆，肝舒而胆亦舒也。方用散偏汤。”	白芍五钱，川芎一两，郁李仁一钱，柴胡一钱，白芥子三钱，香附二钱，甘草一钱，白芷五分。	水煎服。	汤剂
第一批	99	清燥救肺汤	《医门法律》（清·喻嘉言）“治诸气膈郁，诸痿喘呕。”	桑叶三钱（去枝梗），石膏二钱五分（煨），甘草一钱，人参七分，胡麻仁一钱（炒，研），真阿胶八分，麦门冬一钱二分（去心），杏	水一碗，煎六分，频频二、三次滚热服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
				仁七分（炮，去皮尖，炒黄），枇杷叶一片（刷去毛，蜜涂炙黄）。		
第一批	100	凉血地黄汤	《外科大成》（清·祁坤）“治痔肿痛出血。”	归尾一钱五分，生地二钱，赤芍一钱，黄连（炒）二钱，枳壳一钱，黄芩一钱（炒黑），槐角三钱（炒黑），地榆二钱（炒黑），荆芥一钱（炒黑），升麻五分，天花粉八分，甘草五分。	右一剂。加生侧柏二钱，用水二大盅，煎一盅，空心服三、四剂，则痛止肿消，更外兼熏洗。	汤剂
第二批	1	茵陈蒿汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。”	茵陈蒿六两，栀子十四枚（擘），大黄二两（去皮）。	右三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服。	汤剂
第二批	2	桂枝甘草汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。”	桂枝四两（去皮），甘草二两（炙）。	右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。	汤剂
第二批	3	麻黄细辛附子汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“少阴病，始得之，反发热脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。”	麻黄二两（去节），细辛二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。	右三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	汤剂
第二批	4	栀子柏皮汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒身黄发热，栀子柏皮汤主之。”	肥栀子十五个（擘），甘草一两（炙），黄柏二两。	右三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。	汤剂
第二批	5	黄芩汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。”	黄芩三两，芍药二两，甘草二两（炙），大枣十二枚（擘）。	右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。	汤剂
第二批	6	茯苓桂枝甘草大枣汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。”	茯苓半斤，桂枝四两（去皮），甘草二两（炙），大枣十五枚（擘）。	右四味，以甘烂水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	汤剂
第二批	7	附子泻心汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“心下痞，而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。”	大黄二两，黄连一两，黄芩一两，附子一枚（炮，去皮，破，别煮取汁）。	右四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。	汤剂
第二批	8	柴胡桂枝汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。”	桂枝（去皮）、黄芩一两半，人参一两半，甘草一两（炙），半夏二合半（洗），芍药一两半，大枣六枚（擘），生姜一两半（切），柴胡四两。	右九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。	汤剂
第二批	9	通脉四逆汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。”	甘草二两（炙），附子大者一枚（生用，去皮，破八片），干姜三两。	右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。	汤剂
第二批	10	桂枝加厚朴杏子汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。”	桂枝三两（去皮），甘草二两（炙），生姜三两（切），芍药三两，大枣十二枚（擘），厚朴二两（炙，去皮），杏仁五十枚（去皮尖）。	右七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。	汤剂
第二批	11	桂枝麻黄各半汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发……面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。”	桂枝一两十六铢（去皮），芍药、生姜（切）、甘草（炙）、麻黄（去节）各一两，大枣四枚（擘），杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及两仁	右七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
				者)。		
第二批	12	小陷胸汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。”	黄连一两,半夏半升(洗),瓜蒌实大者一枚。	右三味,以水六升,先煮瓜蒌,取三升,去滓,内诸药,煮取二升,去滓,分温三服。	汤剂
第二批	13	柴胡桂枝干姜汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热心烦者,此为未解也,柴胡桂枝干姜汤主之。”	柴胡半斤,桂枝三两(去皮),干姜二两,瓜蒌根四两,黄芩三两,牡蛎二两(熬),甘草二两(炙)。	右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。	汤剂
第二批	14	桂枝人参汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“太阳病,外证未除,而数下之,遂协热而利,利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人参汤主之。”	桂枝四两(别切),甘草四两(炙),白术三两,人参三两,干姜三两。	右五味,以水九升,先煮四味,取五升,内桂,更煮取三升,去滓,温服一升,日再,夜一服。	汤剂
第二批	15	生姜泻心汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“伤寒,汗出解之后,胃中不和,心下痞硬,干噎食臭,肋下有水气,腹中雷鸣下利者,生姜泻心汤主之。”	生姜四两(切),甘草三两(炙),人参三两,干姜一两,黄芩三两,半夏半升(洗),黄连一两,大枣十二枚(擘)。	右八味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。	汤剂
第二批	16	栀子豉汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“发汗后,水药不得入口为逆,若更发汗,必吐下不止。发汗吐下后,虚烦不得眠,若剧者,必反覆颠倒,心中懊,栀子豉汤主之。”	栀子十四个(擘),香豉四合(绵裹)。	右二味,以水四升,先煮栀子,得二升半,内豉,煮取一升半,去滓,分为二服,温进一服,得吐者,止后服。	汤剂
第二批	17	白虎加人参汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“伤寒若吐下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,属白虎加人参汤。”	知母六两,石膏一斤(碎),甘草二两(炙),粳米六合,人参三两。	右五味,以水一斗,煮米熟,汤成去滓,温服一升,日三服。	汤剂
第二批	18	调胃承气汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“阳明病,不吐不下,心烦者,可与调胃承气汤。”	甘草二两(炙),芒硝半升,大黄四两(清酒洗)。	右三味,切,以水三升,煮二物至一升,去滓,内芒硝,更上微火一二沸,温顿服之。	汤剂
第二批	19	大黄黄连泻心汤	《伤寒论》(汉·张仲景)“心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之。”	大黄二两,黄连一两。	右二味,以麻沸汤二升渍之,须臾绞去滓,分温再服。	汤剂
第二批	20	桔梗汤	《金匱要略》(汉·张仲景)“咳而胸满,振寒脉数,咽干不渴,时出浊唾腥臭,久久吐脓如米粥者,为肺痈,桔梗汤主之。桔梗汤方亦治血痹。”	桔梗一两,甘草二两。	右二味,以水三升,煮取一升,分温再服。	汤剂
第二批	21	大黄附子汤	《金匱要略》(汉·张仲景)“肋下偏痛,发热,其脉紧弦,此寒也,以温药下之,宜大黄附子汤。”	大黄三两,附子三枚(炮),细辛二两。	右三味,以水五升,煮取二升,分温三服。	汤剂
第二批	22	当归散	《金匱要略》(汉·张仲景)“妇人妊娠,宜常服当归散主之……产后百病悉主之。”	当归、黄芩、芍药、川芎各一斤,白术半斤。	右五味,杵为散,酒饮服方寸匕,日再服。	散剂
第二批	23	防己黄芪汤	《金匱要略》(汉·张仲景)“风湿,脉浮,身重,汗出,恶风者,防己黄芪汤主之。”	防己一两,甘草半两(炒),白术七钱半,黄芪一两一分(去芦)。	右剉麻豆大,每抄五钱匕,生姜四片,大枣一枚,水盏半,煎八分,去滓,温服,良久再服。	煮散
第二批	24	薏苡附子败酱散	《金匱要略》(汉·张仲景)“肠痈之为病,其身甲错,腹皮急,按之濡,如肿状,腹无积聚,身无热,脉数,此为腹有痈脓,薏苡附子败酱散主之。”	薏苡仁十分,附子二分,败酱五分。	右三味,杵为末,取方寸匕,以水二升,煎减半,顿服。	煮散
第二批	25	射干麻黄汤	《金匱要略》(汉·张仲景)“咳而上气,喉中水鸡声,射干麻黄汤主之。”	射干十三枚、一云三两,麻黄四两,生姜四两,细辛三两,紫菀三两,款冬花三两,五味子半升,大枣七枚,半夏大者八枚(洗)、一法半升。	右九味,以水一斗二升,先煮麻黄两沸,去上沫,内诸药,煮取三升,分温三服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第二批	26	厚朴三物汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“痛而闭者,厚朴三物汤主之。”	厚朴八两,大黄四两,枳实五枚。	右三味,以水一斗二升,先煮二味,取五升,内大黄,煮取三升,温服一升。	汤剂
第二批	27	葶苈大枣泻肺汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“肺病,喘不得卧,葶苈大枣泻肺汤主之。”	葶苈(熬令黄色,捣丸如弹丸大),大枣十二枚。	右先以水三升,煮枣取二升,去枣,内葶苈,煮取一升,顿服。	汤剂
第二批	28	小半夏加茯苓汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“卒呕吐,心下痞,膈间有水,眩悸者,半夏加茯苓汤主之。”	半夏一升,生姜半斤,茯苓三两、一法四两。	右三味,以水七升,煮取一升五合,分温再服。	汤剂
第二批	29	泻心汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“心气不足,吐血,衄血,泻心汤主之。泻心汤方亦治霍乱。”	大黄二两,黄连一两,黄芩一两。	右三味,以水三升,煮取一升,顿服之。	汤剂
第二批	30	苓甘五味姜辛汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“冲气即低,而反更咳,胸满者,	用桂苓五味甘草汤,去桂加干姜、细辛,以治其咳满。”茯苓四两,甘草三两,干姜三两,细辛三两,五味半升。	右五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服半升,日三服。	汤剂
第二批	31	防己茯苓汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之。”	防己三两,黄芪三两,桂枝三两,茯苓六两,甘草二两。	右五味,以水六升,煮取二升,分温三服。	汤剂
第二批	32	越婢汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“风水,恶风,一身悉肿,脉浮不渴,续自汗出,无大热,越婢汤主之。”	麻黄六两,石膏半斤,生姜三两,大枣十五枚,甘草二两。	右五味,以水六升,先煮麻黄,去上沫,内诸药,煮取三升,分温三服。	汤剂
第二批	33	栀子大黄汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“酒黄疸,心中懊,或热痛,栀子大黄汤主之。”	栀子十四枚,大黄一两,枳实五枚,豉一升。	右四味,以水六升,煮取二升,分温三服。	汤剂
第二批	34	枳实芍药散	《金匮要略》(汉·张仲景)“产后腹痛,烦满不得卧,枳实芍药散主之。”	枳实(烧令黑,勿太过)、芍药等分。	右二味,杵为散,服方寸匕,日三服。	散剂
第二批	35	麻黄杏仁薏苡甘草汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“病者一身尽疼,发热,日晡所剧者,名风湿。此病伤于汗出当风,或久伤取冷所致也,可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。”	麻黄半两(去节,汤泡),甘草一两(炙),薏苡仁半两,杏仁十个(去皮尖,炒)。	右剉麻豆大,每服四钱匕,水盪半,煮八分,去滓,温服。	煮散
第二批	36	瓜蒌桂枝汤	《金匮要略》(汉·张仲景)“太阳病,其证备,身体强,然,脉反沉迟,此为痉,瓜蒌桂枝汤主之。”	瓜蒌根二两,桂枝三两,芍药三两,甘草二两,生姜三两,大枣十二枚。	右六味,以水九升,煮取三升,分温三服。	汤剂
第二批	37	温脾丸	《千金要方》(唐·孙思邈)“治久病虚羸,脾气弱,食不消,喜噫方。”	黄柏、大麦芽、吴茱萸、桂心、干姜、细辛、附子、当归、大黄、曲、黄连各一两。	右十一味,末之,蜜丸如梧子。每服十五丸,空腹酒服,日三。	丸剂
第二批	38	生姜甘草汤	《千金要方》(唐·孙思邈)“治肺痿,咳唾涎沫不止,咽燥而渴,生姜甘草汤方。”	生姜五两,甘草四两,人参三两,大枣十二枚。	右四味,咬咀,以水七升,煮取三升,去滓,分三服。	汤剂
第二批	39	延年薯蓣酒	《外台秘要》(唐·王焘)“延年薯蓣酒,主头风眩不能食,补益气力方。”	薯蓣、白术、五味子(碎)、丹参各八两,防风十两,山茱萸二升(碎),人参二两,生姜六两(屑)。	右八味切,以绢袋盛,酒二斗五升浸五日,温服七合,日二,稍加。	酒剂
第二批	40	驻景丸	《太平圣惠方》(宋·王怀隐)“治肝肾俱虚,眼常昏暗,宜服驻景圆方。”	菟丝子五两(酒浸三日,曝干,别捣为末),车前子三两,熟干地黄三两。	右件药,捣罗为末,炼蜜和捣,圆如梧桐子大,每于空心,以温酒下三十圆,晚食前再服。	丸剂
第二批	41	苏子降气汤	《太平惠民和剂局方》(宋·太平惠民和剂局)“治男、女虚阳上攻,气不升降,上盛下虚,膈壅痰多,咽喉不利,咳嗽,虚烦引饮,头目昏眩,腰疼脚弱,肢体倦怠,腹肚疝刺,冷热气泻,大便便秘,涩滞不通,肢体浮肿,有妨饮食。”	紫苏子、半夏(汤洗七次)各二两半,川当归两半(去芦),甘草二两(炙),前胡(去芦)、厚朴(去粗皮,姜汁拌炒)各一两,肉桂一两(去皮)。	右为细末,每服二大钱,水一盪半,入生姜二片,枣子一个,苏五叶,同煎至八分,去渣,热服,不拘时候。	煮散
第二批	42	香苏散	《太平惠民和剂局方》(宋·太平惠民和剂局)“治四时	香附子(炒香,去毛)、紫苏叶各四两,甘草	右为粗末,每服三钱,水一盪,煎七分,	煮散/散

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			瘟疫、伤寒。”	一两（炙），陈皮二两（不去白）。	去滓，热服，不拘时候，日三服。若作细末，只服二钱，入盐点服。	剂
第二批	43	升麻葛根汤	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治大人、小儿时气温疫，头痛发热，肢体烦疼及疮疹已发及未发，疑贰之间，并宜服之。”	升麻、白芍药、甘草（炙）各十两，葛根十五两。	右为粗末，每服三钱，用水一盞半，煎取一钟盞，去滓，稍热服，不计时候，日二、三服，以病气去，身清凉为度。小儿量力服之。	煮散
第二批	44	平胃散	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治脾胃不和，不思饮食，心腹肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，噫气吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气翻胃，并宜服之。”	苍术五斤（去粗皮，米泔浸二日），厚朴（去粗皮，姜汁制，炒香）、陈皮（去白）各二斤二两，甘草三十两（炒）。	右为细末，每服二钱，以水一盞，入生姜二片，干枣两枚，同煎至七分，去姜、枣，带热服，空心、食前。入盐一捻，沸汤点服亦得。	煮散
第二批	45	牡蛎散	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治诸虚不足，及新病暴虚，津液不固，体常自汗，夜卧即甚，久而不止，羸瘠枯瘦，心忪惊惕，短气烦倦。”	黄芪（去苗、土）、麻黄根（洗）、牡蛎（米泔浸，刷去土，火烧通赤）各一两。	右三味，为粗散，每服三钱，水一盞半，小麦百余粒，同煎至八分，去渣，热服，日二服，不拘时候。	煮散
第二批	46	六和汤	《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）“治心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，头目昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，并伤寒阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢疾，中酒烦渴畏食。妇人胎前、产后，并宜服之。”	缩砂仁、半夏（汤洗七次）、杏仁（去皮尖）、人参、甘草（炙）各一两，赤茯苓（去皮）、藿香叶（拂去尘）、白扁豆（姜汁略炒）、木瓜各二两，香薷、厚朴（姜汁制）各四两。	右剉，每服四钱，水一盞半，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，去滓，不拘时候服。	煮散
第二批	47	牵正散	《杨氏家藏方》（宋·杨倓）“治口眼喎斜。”	白附子、白僵蚕、全蝎（去毒）各等分，并生用。	右为细末，每服一钱，热酒调下，不拘时候。	散剂
第二批	48	导痰汤	《传信适用方》（宋·吴彦夔）“治痰厥，头昏晕。”	半夏四两（汤洗七次），天南星一两（细切，姜汁浸），枳实一两（去瓤），橘红一两，赤茯苓一两。	右为粗末，每服三大钱，水两盞，姜十片，煎至一盞，去滓，温服，食后。	煮散
第二批	49	佛手散	《妇人大全良方》（宋·陈自明）“治产后血虚劳倦，盗汗，多困少力，咳嗽有痰。”	当归、川芎、黄芪各一两，北柴胡、前胡各一分。	右咬咀，每服三钱，水一大盞，桃、柳枝各三寸，枣子、乌梅各一枚，姜三片，煎至六分，去滓，温服。	煮散
第二批	50	小蓟饮子	《济生方》（宋·严用和）“治下焦结热血淋。”	生地黄四两（洗），小蓟根、滑石、通草、蒲黄（炒）、淡竹叶、藕节、当归（去芦，酒浸）、山栀子仁、甘草（炙）各半两。	右咬咀，每服四钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，空心食前。	煮散
第二批	51	五虎汤	《仁斋直指》（宋·杨士瀛）“治喘急痰气。”	麻黄七分，杏仁一钱（去皮尖），甘草四分，细茶八分（炒），白石膏一钱五分。	右作一服，白水煎。	汤剂
第二批	52	芍药汤	《素问病机气宜保命集》（金·刘完素）“下血调气，经曰：溲而便脓血，气行而血止，行血则便自愈，调气则后重除。”	芍药一两，当归、黄连各半两，槟榔二钱，木香二钱，甘草二钱（炙），大黄三钱，黄芩半两，官桂一钱半。	右咬咀，每服半两，水二盞，煎至一盞，食后温清服。	煮散
第二批	53	金铃子散	《素问病机气宜保命集》（金·刘完素）“治热厥心痛，或发或止，久不愈者，当用金铃子散。”	金铃子、玄胡各一两。	右为细末，每服三钱，酒调下。	散剂
第二批	54	门冬清肺饮	《内外伤辨惑论》（金·李杲）“治脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。”	紫菀茸一钱五分，黄芪、白芍药、甘草已上各一钱，人参（去芦）、麦门冬已上各五分，当归身三分，五味子三个。	右咬咀，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去粗，温服，食后。	煮散

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第二批	55	普济消毒饮子	《东垣试效方》(金·李杲)“初觉憎寒体重,次传头面肿盛,目不能开,上喘,咽喉不利,舌干口燥,俗云大头天行。”	黄芩、黄连各半两,人参三钱,橘红(去白)、玄参、生甘草各二钱,连翘、黍粘子、板蓝根、马勃各一钱,白僵蚕七分(炒),升麻七分,柴胡二钱,桔梗二钱。	右件为细末……咬咀,如麻豆大,每服秤五钱,水二盏,煎至一盏,去滓,稍热,时时服之。	煮散
第二批	56	羌活胜风汤	《原机启微》(元·倪维德)“治眇多眵,紧涩羞明,赤脉贯睛,头痛鼻塞,肿胀涕泪,脑巅沉重,眉骨酸疼,外翳如云雾、丝缕、秤星、螺盖。”	白术五分,枳壳、羌活、川芎、白芷、独活、防风、前胡、桔梗、薄荷各四分,荆芥、甘草各三分,柴胡七分,黄芩五分。	作一服,水二盏,煎至一盏,去滓,热服。	汤剂
第二批	57	六磨汤	《证治准绳》(明·王肯堂)“治气滞腹急,大便秘涩。”	沉香、木香、槟榔、乌药、枳壳、大黄各等分。	右各件,热汤磨服。	散剂
第二批	58	牛蒡甘桔汤	《外科正宗》(明·陈实功)“治颐毒表邪已尽,耳项结肿,微热不红疼痛者。”	牛蒡子、桔梗、陈皮、天花粉、黄连、川芎、赤芍、甘草、苏木各一钱。	水二钟,煎八分,食后服。	汤剂
第二批	59	大补元煎	《景岳全书》(明·张介宾)“治男妇气血大坏,精神失守危剧等证。”	人参少则用一、二钱,多则用一、二两,山药二钱(炒),熟地少则用二、三钱,多则用二、三两,杜仲二钱,当归二、三钱,山茱萸一钱,枸杞二、三钱,炙甘草一、二钱。	水二钟,煎七分,食远温服。	汤剂
第二批	60	左归饮	《景岳全书》(明·张介宾)“此壮水之剂也。凡命门之阴衰阳胜者,宜此方加减主之。”	熟地二、三钱,或加至一、二两,山药二钱,枸杞二钱,炙甘草一钱,茯苓一钱半,山茱萸一、二钱。	水二钟,煎七分,食远服。	汤剂
第二批	61	举元煎	《景岳全书》(明·张介宾)“治气虚下陷,血崩血脱,亡阳垂危等证,有不利于归、熟等剂,而但宜补气者,以此主之。”	人参、黄芪(炙)各三、五钱,炙甘草一、二钱,升麻五、七分(炒用),白术一、二钱(炒)。	水一钟半,煎七、八分,温服。	汤剂
第二批	62	茜根散	《景岳全书》(明·张介宾)“治衄血不止,心神烦闷。”	茜根、黄芩、阿胶(炒珠)、侧柏叶、生地黄各二钱,甘草一钱(炙)。	水一盏半,姜三片,煎七分,食远服。	汤剂
第二批	63	泰山磐石散	《景岳全书》(明·张介宾)“治妇人血气两虚,或肥而不实,或瘦而血热,或脾肝素虚,倦怠少食,屡有堕胎之患。此方平和,兼养脾胃气血。”	人参、黄芪、当归、川续断、黄芩各一钱,川芎、白芍药、熟地各八分,白术二钱,炙甘草、砂仁各五分,糯米一撮。	水一钟半,煎七分,食远服。	汤剂
第二批	64	滋阴降火汤	《审视瑶函》(明·傅仁宇)“满目萤星乱散,六阳贼火上炎,要救神光不坠,清心滋肾为先……治阴虚火动,起于九泉,此补阴之剂也。”	当归一钱,川芎五分,生地黄(姜汁,炒)、熟地黄、黄柏(蜜水,炒)、知母(同上)、麦冬肉各八分,白芍药(薄荷汁,炒)、黄芩、柴胡各七分,甘草稍四分。	右剉剂,白水二钟,煎至八分,去滓,热服。	煮散
第二批	65	清胃汤	《审视瑶函》(明·傅仁宇)“治眼胞红硬。此阳明经积热,平昔饮酒过多,而好食辛辣炙搏之味所致也。”	山梔仁(炒黑)、枳壳、苏子各六分,石膏(煨)、川黄连(炒)、陈皮、连翘、归尾、荆芥穗、黄芩、防风各八分,甘草三分(生)。	右剉剂,白水二钟,煎至一钟,去滓,热服。	煮散
第二批	66	解郁汤	《傅青主女科》(清·傅山)“两胁闷而疼痛,如弓上弦……治法宜开肝气之郁结,补肝血之燥干。”	人参一钱,白术五钱(土炒),白茯苓三钱,当归一两(酒洗),白芍一两(酒炒),枳壳五分(炒),砂仁三粒(炒,研),山梔子三钱(炒),薄荷二钱。	水煎服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第二批	67	固本止崩汤	《傅青主女科》(清·傅山)“妇人有一时血崩……必须于补阴之中行止崩之法,方用固本止崩汤。”	大熟地一两(九蒸),白术一两(土炒焦),黄芪三钱(生用),当归五钱(酒洗),黑姜二钱,人参三钱。	水煎服。	汤剂
第二批	68	养精种玉汤	《傅青主女科》(清·傅山)“妇人瘦怯身軀,久不孕育……方用养精种玉汤。”	大熟地一两(九蒸),当归五钱(酒洗),白芍五钱(酒炒),山萸肉五钱(蒸熟)。	水煎服。	汤剂
第二批	69	定经汤	《傅青主女科》(清·傅山)“妇人经来断续,或前或后无定期……方用定经汤。”	菟丝子一两(酒炒),白芍一两(酒炒),当归一两(酒洗),大熟地五钱(九蒸),山药五钱(炒),白茯苓三钱,芥穗二钱(炒黑),柴胡五分。	水煎服。	汤剂
第二批	70	调肝汤	《傅青主女科》(清·傅山)“妇人少腹疼于行经之后者……方用调肝汤。”	山药五钱(炒),阿胶三钱(白面炒),当归三钱(酒洗),白芍三钱(酒炒),山萸肉三钱(蒸熟),巴戟一钱(盐水浸),甘草一钱。	水煎服。	汤剂
第二批	71	柴葛解肌汤	《医学心悟》(清·程国彭)“治春温夏热之病,其症发热头痛,与正伤寒同,但不恶寒而口渴,与正伤寒异耳,本方主之。”	柴胡一钱二分,葛根一钱五分,赤芍一钱,甘草五分,黄芩一钱五分,知母一钱,贝母一钱,生地二钱,丹皮一钱五分。	水煎服。	汤剂
第二批	72	茵陈术附汤	《医学心悟》(清·程国彭)“阴黄之证,身冷,脉沉细,乃太阴经中寒湿,身如熏黄,不若阳黄之明如橘子色也……小便自利,茵陈术附汤主之。”	茵陈一钱,白术二钱,附子五分,干姜五分,甘草一钱(炙),肉桂三分(去皮)。	水煎服。	汤剂
第二批	73	消瘰丸	《医学心悟》(清·程国彭)“瘰疬者,肝病也。肝主筋,肝经血燥有火,则筋急而生瘰。瘰多生于耳前者,肝之部位也。其初起即宜消瘰丸消散之。”	元参(蒸)、牡蛎(煅,醋研)、贝母(去心,蒸)各四两。	共为末,炼蜜为丸,每服三钱,开水下,日二服。	丸剂
第二批	74	阳和汤	《外科证治全生集》(清·王维德)“此方主治骨槽风、流注、阴疽、脱骨疽、鹤膝风、乳岩、结核、石疽、贴骨疽及漫肿无头,平塌白陷,一切阴凝等证。”	熟地黄一两,麻黄五分,鹿角胶三钱,白芥子二钱(炒,研),肉桂一钱,生甘草一钱,炮姜炭五分。	水煎服。①	汤剂
第二批	75	柴胡清肝汤	《医宗金鉴》(清·吴谦)“柴胡清肝治怒证,宣血疏通解毒良,四物生用柴翘蒡,黄芩梔粉草节防。”	柴胡、生地各一钱五分,当归二钱,赤芍一钱五分,川芎一钱,连翘二钱(去心),牛蒡子一钱五分(炒,研),黄芩一钱,生梔子(研)、天花粉、甘草节、防风各一钱。	水二钟,煎八分,食远服。	汤剂
第二批	76	四物消风饮	《医宗金鉴》(清·吴谦)“四物消风饮调荣,血滋风减赤色平,荆防鲜蝉兼独活,柴薄红枣水煎浓。”	生地三钱,当归二钱,荆芥、防风各一钱五分,赤芍、川芎、白鲜皮、蝉蜕、薄荷各一钱,独活、柴胡各七分。	红枣肉二枚,水二钟,煎八分,去渣服。	汤剂
第二批	77	地黄饮	《医宗金鉴》(清·吴谦)“地黄饮治血风疮,痒盛不眠血燥伤,首乌丹皮生熟地,黑参归莢草红僵。”	生地、熟地、何首乌(生)各三钱,当归二钱,丹皮、黑参、白蒺藜(炒,去刺)、僵蚕(炒)各一钱五分,红花、甘草(生)各五分。	水煎,早晚服。	汤剂
第二批	78	凉血四物汤	《医宗金鉴》(清·吴谦)“凉血四物鼓鼻红,散瘀化滞又调荣,芩苓四物陈红草,姜煎加酒入五灵。”	当归、生地、川芎、赤芍、黄芩(酒炒)、赤茯苓、陈皮、红花(酒洗)、甘草(生)各一钱。	水二钟,姜三片,煎八分,加酒一杯,调五灵脂末二钱,热服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第二批	79	滋水清肝饮	《寿世新编》(清·万潜斋)“治胃脘燥痛,气逆左肋而上,呕吐酸水,忽热忽寒,或心腹发烧,或小便赤热。”	熟地四五钱,或七八钱或两余,当归、白芍各一二钱,枣仁三钱,山萸肉一钱五分或二钱,云苓三五钱,山药四五钱,柴胡数分或一钱余,山栀一二钱,丹皮一钱或二钱,泽泻二钱。	水煎服。	汤剂
第二批	80	黄芪汤	《金匱翼》(清·尤怡)“治老人虚闭。”	绵黄芪、陈皮(去白)各半两。右为末,每服三钱,用大麻仁	一合研烂,以水投取浆水一盞,滤去滓,于银石器内煎,后有乳起,即入白蜜一大匙,再煎令沸,调药末,空心食前服。	煮散
第二批	81	蒿芩清胆汤	《通俗伤寒论》(清·俞根初)“和解胆经法。”	青蒿脑钱半至二钱,淡竹茹三钱,仙半夏钱半,赤茯苓三钱,青子芩钱半至三钱,生枳壳钱半,陈广皮钱半,碧玉散三钱(包煎)。	水煎服。①	汤剂
第二批	82	柴胡陷胸汤	《通俗伤寒论》(清·俞根初)“和解兼开降法。”	柴胡一钱,姜半夏三钱,小川连八分,苦桔梗一钱,黄芩钱半,瓜蒌仁五钱(杵),小枳实钱半,生姜汁四滴(分冲)。	水煎服。②	汤剂
第二批	83	升降散	《伤寒瘟疫条辨》(清·杨栗山)“温病亦杂气中之一也,表里三焦大热,其证不可名状者,此方主之。”	白僵蚕二钱(酒炒),全蝉蜕一钱(去土),广姜黄三分(去皮),川大黄四钱(生)。右为细末,合研匀。病轻者,	分四次服,每服重一钱八分二厘五毫,用黄酒一盅,蜂蜜五钱,调匀冷服,中病即止。病重者,分三次服,每服重二钱四分三厘三毫,黄酒盅半,蜜七钱五分,调匀冷服。最重者,分二次服,每服重三钱六分五厘,黄酒二盅,蜜一两,调匀冷服。	散剂
第二批	84	宣痹汤	《温病条辨》(清·吴塘)“湿聚热蒸,蕴于经络,寒战热炽,骨骱烦疼,舌色灰滞,面目痿黄,病名湿痹,宣痹汤主之。”	防己五钱,杏仁五钱,滑石五钱,连翘三钱,山栀三钱,薏苡五钱,半夏三钱(醋炒),晚蚕沙三钱,赤小豆皮三钱。	水八杯,煮取三杯,分温三服。	汤剂
第二批	85	增液承气汤	《温病条辨》(清·吴塘)“阳明温病,下之不通……津液不足,无水舟停者,间服增液,再不下者,增液承气汤主之。”	元参一两,麦冬八钱(连心),细生地八钱,大黄三钱,芒硝一钱五分。①	水八杯,煮取三杯,先服一杯,不知再服。	汤剂
第二批	86	通窍活血汤	《医林改错》(清·王清任)“通窍活血汤所治之病,开列于后……头发脱落、眼疼白珠红、糟鼻子、耳聋年久、白癜风、紫癜风、紫印脸、青记脸如墨、牙疳、出气臭、妇女干劳、男子劳病、交节病作、小儿疳症……通窍全凭好麝香,桃红大枣老葱姜,川芎黄酒赤芍药,表里通经第一方。”	赤芍一钱,川芎一钱,桃仁三钱(研泥),红花三钱,老葱三根(切碎),鲜姜三钱(切碎),红枣七个(去核),麝香五厘(绢包)。	用黄酒半斤,将前七味煎一钟,去渣,将麝香入酒内,再煎二沸,临卧服。	汤剂
第二批	87	膈下逐瘀汤	《医林改错》(清·王清任)“膈下逐瘀汤所治之症,开列于后……积块、小儿痞块、痛不移处、卧则腹坠、肾泻、久泻……膈下逐瘀桃牡丹,赤芍乌药元胡甘,归芎灵脂红花壳,香附开郁血亦安。”	灵脂二钱(炒),当归三钱,川芎二钱,桃仁三钱(研泥),丹皮二钱,赤芍二钱,乌药二钱,元胡一钱,甘草三钱,香附钱半,红花三钱,枳壳钱半。	水煎服。① 据古籍原文“增液汤方,元参一两,麦冬八钱(连心),细生地八钱”“增液承气汤,即于增液汤内,加大黄三钱,芒硝一钱五分”补。	汤剂
第二批	88	会厌逐瘀汤	《医林改错》(清·王清任)“会厌逐瘀是病源,桃红甘桔地归玄,柴胡枳壳赤芍药,水呛血凝立可痊。”	桃仁五钱(砂),红花五钱,甘草三钱,桔梗三钱,生地四钱,当归二钱,玄参一钱,柴胡一钱,枳壳二钱,赤芍二钱。	水煎服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
第二批	89	连朴饮	《霍乱论》(清·王士雄)“治湿热蕴伏而成霍乱,兼能行食涤痰。”	制厚朴二钱,川连(姜汁炒)、石菖蒲、制半夏各一钱,香豉(炒)、焦栀各三钱,芦根二两。	水煎温服。	汤剂
第二批	90	补肾活血汤	《伤科大成》(清·赵濂)“伤肾者,两耳立聋……次以补肾活血汤……伤气眼者,气喘痛极……次以酒煎补肾活血汤。”	熟地三钱,杜仲一钱,杞子一钱,破故纸三钱,菟丝子三钱,归尾一钱,没药一钱,萸肉一钱,红花五分,独活一钱,淡苁蓉一钱。	水煎服。①	汤剂
第二批	91	寿胎丸	《医学衷中参西录》(清·张锡纯)“治滑胎。”	菟丝子四两(炒熟),桑寄生二两,川续断二两,真阿胶二两。	右药将前三味轧细,水化阿胶和为丸,一分重(干足一分)。每服二十九,开水送下,日再服。①古籍原文无煎服法,据现代教材补“水煎服”。	丸剂
第二批	92	活络效灵丹	《医学衷中参西录》(清·张锡纯)“治气血凝滞,痲痺癥瘕,心腹疼痛,腿疼臂疼,内外疮疡,一切脏腑积聚,经络湮淤。”	当归五钱,丹参五钱,生明乳香五钱,生明没药五钱。	右药四味作汤服。若为散,一剂分作四次服,温酒送下。	汤剂/散剂
第二批	93	理冲汤	《医学衷中参西录》(清·张锡纯)“治妇女经闭不行,或产后恶露不尽结为癥瘕,以致阴虚作热,阳虚作冷,食少劳嗽,虚证沓来……亦治室女月闭血枯。并治男子劳瘵,一切脏腑癥瘕、积聚、气郁、脾弱、满闷、痞胀、不能饮食。”	生黄芪三钱,党参二钱,于术二钱,生山药五钱,天花粉四钱,知母四钱,三棱三钱,莪术三钱,生鸡内金(黄者)三钱。	用水三钟,煎至将成,加好醋少许,滚数沸服。	汤剂
藏药方	1	三味蔷薇散	《临床札记甘露药库》(19世纪)(吴坚铁巧)“用于‘赤巴’病、‘培根色布’病等引起的恶心、头痛等。”	蔷薇花 15 份,波棱瓜子 7 份,诃子 3 份。	粉碎成细粉、混匀,一次取一勺,凉开水送服。	散剂
藏药方	2	八味如意	《临床札记补充方剂》(19世纪末)(嘎玛尖参)“用于白脉病、‘楷长木’病等。”	主药珍珠母(制) 2 份,其余甘草浸膏、肉豆蔻、豆蔻、草果、石灰华、红花、丁香、草莓苗、石榴子各 1 份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服 5 丸或 7 丸或 9 丸。	丸剂
藏药方	3	索罗西汤	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于肺热咳嗽,发烧,气短,痰中带血。”	主药丛菴 2 份,甘草、紫草茸、岩白菜各 1 份。	粉碎成粗粉,药材 1 份、16 份水,水煎之 5 份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	4	小月晶丸	《医学利乐宝库》(18世纪末)(嘎玛额乐旦增)“用于‘培根木布’病及浮肿等症。”	寒水石(制)、铁屑(诃子制)各 1 份,土木香、沙棘膏、芫荽各 0.5 份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服 5 丸或 7 丸或 9 丸。	丸剂
藏药方	5	七味甘露	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于热性‘培根’、‘培根木布’等病。”	芫荽果、土木香、绿绒蒿各 2 份,石榴子、木瓜、沙棘膏、芫荽各 1 份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服 5 丸或 7 丸或 9 丸。	丸剂
藏药方	6	清血散	《居迷旁医著集》(19世纪)(迷旁朗杰加措)“用于‘查彩’病、‘培查’病等引起的头痛、口干、喉燥、目赤、音哑、局部紫绀、胸背对痛等。”	余甘子(去核)、矮紫堇、藏锦鸡儿、紫檀、藏紫草各 2 份,洪连、土木香、甘草各 1 份,沙棘、寒水石(制)、石灰华各 0.5 份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	7	石榴止带散	《藏医如意大全》(17世纪中旬)(轮厅巴堆孜久美)“用于‘楷常’病、‘隆湊’病等引起的白带异常、月经失调、小腹疼痛。”	石榴子、大托叶云实(制)各 2 份,肉桂、豆蔻、芫荽、红花各 1 份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	8	草本五鹏丸	《医学千万舍利》(15世纪中旬)(苏喀娘尼多吉)“用于‘仁彩’病、‘森’病等。”	乌奴龙胆 1 份,秦艽花 2 份,藓生马先蒿 3 份,假楼斗菜 4 份,菥达夏 5 份。	粉碎成细粉、混匀、制成鼠粪大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服 5 丸或 7 丸或 9 丸。	丸剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
藏药方	9	豆蔻安宁	《藏医医诀补遗》(17世纪末)(第司桑杰嘉措)“用于‘隆凑’等病引起的失眠、心慌、胸闷、腰膝酸痛、洪热汗出、头晕耳鸣、情志异常、烦躁易怒等。”	黄精、天冬、手参(制)、肉豆蔻、丁香、沉香各1份,豆蔻6份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服5丸或7丸或9丸。	丸剂
藏药方	10	达尔强散	《迷旁医著》(19世纪末)(迷旁朗杰加错):“用于跌打损伤、‘查隆’病引起的气血上壅、呼吸困难;积食不化、痞瘤;血瘀癥瘕等。”	碱花(制)3份,沙棘1份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	11	健胃消痞散	《贡追临床札记》(19世纪末)(贡追云丹加错)“用于消化不良、培根痞瘤等寒性胃病。”	石榴子、甘青青兰为各4份,剩余诃子、丁香、寒水石、芫荽四味各1份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	12	七味冰片	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于‘赤彩’病、‘洛彩’病等引起的发热、痰多粘稠、口干烦渴、头痛目赤、胸背胀痛、胸闷气促等。”	冰片1份、石灰华7份,其余檀香、牛黄、红花、洪连、印度獐牙菜各2份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服5丸或7丸或9丸。	丸剂
藏药方	13	七味松石丸	《秘诀宝源》(19世纪中旬)(江白曲吉旦增赤列)“用于‘培根木布’病、‘钦查木布’病、‘钦彩病’等引起的胸背胀痛、肋肋疼痛等。”	松石(制)2份,石灰华1份,红花5份,甘青青兰2份,绿绒蒿2份,巴夏嘎1份,渣驯(膏)1份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服5丸或7丸或9丸。	丸剂
藏药方	14	五味姜黄丸	《秀多医学汇集》(16世纪末)(秀多贡布)“用于‘晶尼萨酷’病、‘楷常’病等引起的腰腿酸痛、尿液浑浊、尿淋漓不尽、尿频、尿急等。”	姜黄2份,余甘子、小檗皮、蒜薹子、蒺藜(制)各1份。	药材粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用青稞酒送服5丸或7丸或9丸。	丸剂
藏药方	15	玛奴西汤	《临床札记甘露药库》(19世纪)(吴坚铁巧)“用于‘仁彩’病、空虚热(虚热)、未成熟热等引起的寒战,发热、鼻塞、流涕、头痛、口干烦渴、关节酸痛、心烦胸闷等症。”	土木香2份,悬钩木1份,宽筋藤2份,干姜0.5份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	16	八味疏肝散	《医学利乐宝库》(18世纪末)(嘎玛额乐且增)“用于‘钦查木布’病、肝脏肿瘤、‘钦彩’病等引起的上腹不适、肝区疼痛,疲乏无力。”	红花2份,巴夏嘎、石灰华、绿绒蒿、松蒂、诃子(去核)、渣驯(膏)、木香等各1份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	17	三味诃子汤	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于各种原因引起的便秘等症。”	主药诃子(去核)2份,大黄、碱花(制)各1份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	18	六味清咽	《德格拉曼医著》(19世纪)(德格拉曼)“用于咳嗽、声音嘶哑、咽喉肿痛等。”	唐古特乌头(榜嘎)、秦艽花、青藏龙胆(龙胆)为各1份,檀香、丛菴、坎巴阿仲为各2份。	粉碎成细粉、混匀、制成羊粪大小的药,阴干。根据病情及年龄、体质等情况,含服1-3个。	丸剂
藏药方	19	七味利胆散	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于‘赤彩’病、胆病引起的恶心、呕吐、头疼、发热、厌食、口苦、巩膜及皮肤黄染等。”	洪连、翼首草、矮紫堇、秦艽花为主药,各2份;苦荚菜、小檗皮、榜嘎各1份。	粉碎成细粉、混匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	20	四味石榴散	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于分清泌浊、消化不良、食欲不振、积食不化等。”	主药石榴子2份,肉桂、豆蔻、芫荽各1份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	21	十味青兰散	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于‘培根木布’病引起的胃脘胀痛、反酸、嗝气、腹胀、腹痛、便秘、血便、呕血等症。”	甘青青兰、蒲公英、糖茶藨、沙棘和姜黄为主药,各2份,櫻草杜鹃、肉桂、肉豆蔻、黄精、宽筋藤为辅药,各1份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,温开水服用。	散剂
藏药方	22	五味宽筋汤	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于‘陈普’病、‘叱乃’引起的关节红、肿、热、痛、活动受限等。”	宽筋藤为2份,诃子(去核)、余甘子(去核)、毛诃子(去核)、印度獐牙菜各1份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
藏药方	23	十一味痛风汤	《迷旁医著》(19世纪末)(迷旁朗杰加错)“用于‘叱乃’引起的四肢关节红、肿、热、痛,活动受限等。”	宽筋藤2份,生等、秦艽花、洪连、巴夏嘎、小檗皮、穆库尔没药、渣驯膏、诃子(去核)、余甘子(去核)、毛诃子(去核)各1份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	24	三味清心汤	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于‘宁彩’病引起的心慌、胸闷、气促、口干舌燥、目赤、胸背疼痛、心前区灼痛等。”	紫檀、肉豆蔻、广枣各1份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	25	三味黄精汤	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于各种妇科病引起的小腹胀痛、月经紊乱、痛经、白带异常等症。”	蒺藜(制)、黄精、喜马拉雅紫茉莉各1份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	26	七味消肿散	《临床札记补充方剂》(19世纪末)(嘎玛尖参)“各种病引起的浮肿、腹水、口渴、少尿、气喘等症。”	红花、甘青青兰各2份,其余绿绒蒿、波棱瓜子、榜嘎、巴夏嘎、余甘子(去核)各1份。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	27	十味利尿散	《嘎玛冉纳医著选集》(18世纪末)(嘎玛额顿旦增赤列热杰)“用于各种病引起的浮肿、腹水等。”	四味石榴(石榴子1份,肉桂、豆蔻、苹荑各半份)基础上增加红花、海金沙、螃蟹(制)、芫荽、冬葵果各1份,余甘子(去核)5份。	粉碎成细粉,均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	28	七味毛莲蒿	《临床札记甘露药库》(19世纪)(吴坚铁巧)“用于各种‘粘彩’的预防与治疗。”	毛莲蒿、穆库尔没药为主药,各10份,黑冰片、紫草茸、藏茜草、棘豆各2份,麝香1份。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	29	十五味紫檀丸	《医著甘露珍宝》(19世纪)(林曼扎西本)“用于‘洛彩’病、‘洛杰’病等引起的咳嗽、痰多气塞、胸闷胸痛、心悸气促、局部发绀等。”	紫檀3份,红花1.5份,木香、沙棘膏为紫檀的2/3份,再加诃子(去核)、肉果草、丛菴、葡萄、甘草、琥珀、余甘子(去核)、石灰华、藏紫草、洪连、角蒿各1份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药,阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服5丸或7丸或9丸。	丸剂
藏药方	30	五味蒺藜散	《迷旁医著集》(19世纪末)(迷旁朗杰加错)“用于‘陈普’病、‘叱乃’病等引起的关节疼痛、活动受限等。”	蒺藜(制)2份,喜马拉雅紫茉莉、花椒、木香、宽筋藤、驴血各1份制粗粉。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	31	三味蒺藜汤	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“用于‘楷常’病、膀胱病等引起的排尿不畅、淋漓不尽、少尿、尿涩等,亦可用于各种原因引起的浮肿、腹水。”	蒺藜(制)、冬葵果、螃蟹(制)各等量。	粉碎成粗粉,药材1份、16份水,水煎之5份;一次取一杯茶碗的量服用。	汤剂
藏药方	32	加味黑冰片散	《居迷旁医著集》(19世纪末)(迷旁朗杰加错)“‘常赤’病、‘培根色布’病、痞瘤等。”	石榴子、黑冰片为各2份,肉桂、豆蔻、苹荑、诃子(去核)、光明盐、波棱瓜子、蔷薇花、渣驯(膏)各1份,熊胆粉为半个半(1/4)。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
藏药方	33	萝蒂愈创丸	《医学千万舍利》(15世纪中甸)(苏喀娘尼多吉)“用于跌打损伤引起的软组织损伤、瘀血肿痛等,也可用于接骨续筋。”	棘豆、洪连、迭裂黄堇、秦皮、蒲公英、川西合耳菊(膏)、网眼瓦韦、萝蒂、草莓苗各1份,麝香、熊胆、川西合耳菊膏各1/4份。	粉碎成细粉、混匀、制成豌豆大小的丸药、阴干。根据病情及年龄、体质等情况,用温开水送服5丸或7丸或9丸。	丸剂
藏药方	34	葡萄止咳散	《四部医典》(8世纪末)(宇妥云丹贡布)“咽喉热症引起的咳嗽、咽喉燥阻、声嘶刺痛等症。”	葡萄、石灰华、红花、甘草、圆穗蓼、肉桂、石榴子。一般药物用量相等,主药之量须加大(葡萄2份,其余各1份)。	粉碎成细粉、均匀;一次取一勺,用温开水送服。	散剂
蒙药方	1	文冠木三味汤	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于热性和如乎病(类似风湿病)。”	文冠木、土木香、苦参各等量。	以上3味,研碎成粗粉,过筛,每日1~2次,每次0.6~1钱,用水煎服。	汤剂
蒙药方	2	广枣三味汤	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于	广枣2份,苦参1份,诃子1份。	以上3味,研碎成粗粉,过筛,每日1~	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			血性心刺痛。”		3次，每次0.6~1钱，用水煎服。	
蒙药方	3	诃子三味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于乳肿。”诃子3钱，瞿麦3钱，秦艽花2钱。	以上3味，研碎成粗粉，过筛，每日1~2次，每次0.6~1钱，用水	煎服。	汤剂
蒙药方	4	阿魏三味散	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于赫依性头痛症(类似神经性头痛)。”	阿魏、干姜、紫硃砂各等量。	以上3味，研碎成细粉，过筛，每日1~3次，每次0.3~0.6钱，用温开水送服。	散剂
蒙药方	5	石榴四味散	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于巴达干病(消化不良症)。”	石榴1两，光明盐2钱，豆蔻2钱，荜茇1钱。	以上4味，研碎成细粉，过筛，每日2~3次，每次0.3~0.6钱，用温开水送服。	散剂
蒙药方	6	梔子三味散	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于消渴病。”	梔子2钱，芫荽子3钱，瞿麦3钱。	以上3味，研碎成细粉，过筛，每日1~3次，每次0.3~0.6钱，用蜂蜜汤送服。	散剂
蒙药方	7	射干四味汤	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于宝如(类似溃疡病)扩散病。”	射干、土木香、木香、瞿麦各等量。	以上4味，研碎成粗粉，过筛，每日1~3次，每次0.6~1钱，用水煎煮凉服。	汤剂
蒙药方	8	当归四味散	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于闭经，月经不调，腰腿酸痛。”	当归4钱，大黄2钱，血竭2钱，刺柏叶2钱。	以上4味，研碎成细粉，过筛，每日1~2次，每次0.3~0.6钱，用温开水送服。	散剂
蒙药方	9	文冠木四味汤	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于热性协日乌苏病(热性风湿病)。”	文冠木2份，诃子1份，秦艽花1份，黄柏1份。	以上4味，研碎成粗粉，过筛，每日1~3次，每次0.6~1钱，用水煎服。	汤剂
蒙药方	10	苦参七味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于未成熟热病，发汗等。”	苦参1两，土木香1两，诃子9钱，川楝子9钱，梔子9钱，肋柱花8钱，胡黄连5钱。	以上7味，研碎成粗粉，过筛，制成汤剂。每日2~3次，每次0.6~1钱，用水煎服。	汤剂
蒙药方	11	明月汤	《珊瑚验方》(19世纪·伊希丹僧旺吉拉)“用于目赤红肿及刺痛，血希拉性眼病(热性眼病)。”	西青果、黄柏、梔子、川楝子、木香、苏木各等量。	以上6味，研碎成粗粉，过筛，每日2~3次，每次0.6~1钱，水煎凉服。	汤剂
蒙药方	12	茜草四味散	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于各种呕吐症。”	茜草、干姜、莱菔子、荜茇各等量。	以上4味，研碎成细粉，过筛，每日1~3次，每次0.3~0.6钱，白开水送服。	散剂
蒙药方	13	小茴香三味汤	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“对心赫依病(包括心慌、心悸等)具有特效。”	小茴香3钱，紫硃砂2钱，山柰1钱。	以上3味，研碎成粗粉，过筛，每日1~2次，每次0.6~1钱，用水煎服。	汤剂
蒙药方	14	血证普清四味汤	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于血证热症，精华不消(包括高血脂、糖尿病等)。”	瞿麦、梔子、胡黄连、肋柱花各等量。	以上4味，研碎成粗粉，过筛，每日1~3次，每次0.6~1钱，水煎凉服。	汤剂
蒙药方	15	高良姜四味散	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于呃逆频作，气滞胸痛，浮肿等。”	高良姜5钱，阿魏2钱，土木香5钱，紫硃砂1钱。	以上4味，研碎成细粉，过筛，每日1~2次，每次0.3~0.6钱，白糖水送服。	散剂
蒙药方	16	侧柏四味汤	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于肾热，尿频，尿闭。”	侧柏叶3钱，诃子3钱，川楝子3钱，梔子3钱。	以上4味，研碎成粗粉，过筛，每日1~3次，每次0.6~1钱，加1斤水煎煮，剩3两时凉服。	汤剂
蒙药方	17	胡黄连六味汤	《四部甘露》(18世纪·伊希巴拉召尔)“用于伤热。”	胡黄连、漏芦花、瞿麦、秦艽花、三七、茜草各等量。	以上6味，研碎成粗粉，过筛，每日1~3次，每次0.6~1钱，用水煎服。	汤剂
蒙药方	18	柿子六味散	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于巴达干、希拉合并症(寒热合并症)。”	柿子1两，土木香2钱，芫荽子0.5钱，木香0.5钱，山柰0.5钱，梔子0.5钱。	以上6味，研碎成细粉，过筛，每日1~2次，每次0.3~0.6钱，用温开水送服。	散剂
蒙药方	19	润僵五味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于陈旧性热症、隐伏热症，用于污血和精血相混症。”	梔子5钱，苦参5钱，诃子3钱，川楝子3钱，肋柱花2钱。	以上5味，研碎成粗粉，过筛，每日1~2次，每次0.6~1钱，用水煎服。	汤剂
蒙药方	20	光明盐三味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于胃火衰败，巴达干寒症(胃寒症)。”	光明盐5钱，高良姜3钱，诃子2钱。	以上3味，研碎成粗粉，过筛，每日1~2次，每次0.6~1钱，用水煎温服。	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
蒙药方	21	北沙参七味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于肺部八种病。”	北沙参3两,诃子5钱,栀子5钱,茜草5钱,紫草茸5钱,紫草5钱,川楝子3钱。	以上7味,研碎成粗粉,过筛,每日1~3次,每次0.6~1钱,用水煎服。	汤剂
蒙药方	22	枇杷叶二味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于月经过多,白带过多,身体虚弱。”	枇杷叶7钱,姜黄8钱。	以上2味,研碎成粗粉,过筛,每日1~2次,每次0.6~1钱,用水煎服。	汤剂
蒙药方	23	木香二味汤	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于希拉引起的耳病(热性耳病)。”	木香3钱,诃子3钱。	以上2味,研碎成粗粉,过筛,每日1~3次,每次0.6~1钱,水煎,取汁,口服或滴耳。	汤剂
蒙药方	24	清热汤	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于炽热症。”	苦参2钱,栀子2钱,川木通2钱,胡黄连1钱,肋柱花1钱,瞿麦1钱。	以上6味,研碎成粗粉,过筛,每日3次,每次0.6~1钱,用水煎服。	汤剂
蒙药方	25	黑鹏五味汤剂	《珊瑚验方》(19世纪·伊希丹僧旺吉拉)“用于寒性巴达干病(胃寒症)。”	光明盐、干姜、葶苈、诃子、紫硃砂各等量。	以上5味,研碎成粗粉,过筛,每日1~3次,每次0.6~1钱,用水煎温服。	汤剂
蒙药方	26	黑矾三味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于口舌及齿龈部溃烂等口腔诸症。”	黑矾1钱,诃子2钱,枇杷叶3钱。	以上3味,研碎成粗粉,过筛,每日2~4次,每次0.6~1钱,水煎,取汁漱口。	汤剂
蒙药方	27	五味甘露浴	《哲对宁诺尔》(19世纪·罗布桑却丕勒)“用于奇哈(痈疽),旧创伤,结核,白脉病,筋脉损伤。”	照山白、刺柏叶各1份,麻黄、水柏枝各2份,小白蒿3份。	以上5味,研碎成粗粉,过筛,加6倍水煎煮3次,取汁;每日1次,取适量,药浴用。	汤剂(外用)
蒙药方	28	红花清心七味散	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于心热,心悸,心痛症等。”	红花、天竺黄、牛黄各2钱,肉豆蔻、沉香、广枣、木香各1钱。	以上7味,研碎成细粉,过筛,每日1~3次,每次0.3~0.6钱,用凉开水送服。	散剂
蒙药方	29	大托叶云实六味散	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于由赫依(寒)所致的白带过多,月经淋漓,腰肾疼痛,精华与糟粕分离功能失调,未消化引起的胃痛等。”	大托叶云实3钱,红花2钱,石榴8钱,肉桂1钱,豆蔻1钱,葶苈1钱。	以上6味,研碎成细粉,过筛,每日1~2次,每次0.3~0.6钱,用温开水送服。	散剂
蒙药方	30	紫檀香三味汤	《通瓦嘎吉德》(19世纪·吉格木德丹僧扎木苏)“用于心热病”。	紫檀香5钱,肉豆蔻5钱,广枣3钱。	以上3味,研碎成粗粉,过筛,每日1~3次,每次0.3~0.6钱,煎汤凉服。	汤剂
蒙药方	31	紫草茸五味汤	《珊瑚验方》(19世纪·伊希丹僧旺吉拉)“用于肾热,肾、膀胱病。”	紫草茸3钱,茜草3钱,枇杷叶3钱,诃子3钱,黄柏3钱。	以上5味,研碎成粗粉,过筛,每日1~3次,每次0.6~1钱,水煎凉服。	汤剂
蒙药方	32	四红汤	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于肾隐伏热,肾、肺伤热。”	茜草、紫草、枇杷叶、紫草茸各等量。	以上4味,研碎成粗粉,过筛,每日3次,每次0.6~1钱,煎服。	汤剂
蒙药方	33	巴呼七味散	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于赫依、巴达干性巴乎病(类似甲状腺肿大)。”	葶苈4钱,干姜3钱,照山白2钱,花椒1钱,肉豆蔻2钱,光明盐3钱,益智仁3钱。	以上7味,研碎成细粉,过筛,每日1~2次,每次0.3~0.6钱,用温开水送服。	散剂
蒙药方	34	冰片七味散	《秘诀方海》(19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来)“用于炽热症。”	冰片2份,天竺黄2份,白檀2份,红花1份,胡黄连1份,瞿麦1份,肋柱花1份。	以上7味,研碎成细粉,过筛,每日1~2次,每次0.3~0.6钱,用凉开水送服。	散剂
维药方	1	依提尔非里夏塔热	《医学之目的》(公元1737年,木拉德拜克·艾里拜克)“治疗头部和其他部位皮疹和皮痒。”	诃子(炒黄)1米斯卡尔,地锦草、番泻叶各取3米斯卡尔,苦艾4.5米斯卡尔。	药味研碎成细粉,过筛,巴旦油混合,用无核葡萄干糅合,制成蜜膏。口服,4带尔海木。	蜜膏剂
维药方	2	买朱尼努加	《拜地依药书》(公元1368年,再努勒·艾塔尔)“清除异常脾液质,用于麻力胡利亚。”	西青果(炒黄)、余甘子(去核奶泡)各取5带尔海木,薰衣草、水龙骨、菟丝草各取1带尔海木。	药味研碎成细粉,过筛,加三倍量的蜂蜜制成蜜膏。口服,3~5带尔海木。	蜜膏剂
维药方	3	艾非提蒙醋合剂	《药物宝库大全》(公元20世纪初,吾拉木·格拉汗)“用于痲病,狂躁不安,麻力胡利亚。”	菟丝草、水龙骨、盒果藤根(除木芯)、牛舌草、铁线蕨、菊苣子(略炒)、丁香罗勒子(略炒)、香青兰各取2带尔海木,玫瑰花糖膏	药味加入20壶木日葡萄醋和10壶木日水,煎煮,滤过,加白砂糖制成醋合剂。口服,一次1壶木日。	醋合剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
				20 带尔海木。		
维药方	4	买朱尼马德土里	《药物精华》(公元 1833 年, 穆罕穆德·艾山)“助消化, 开胃, 调节异常黏液质, 填精, 提高性欲, 固齿; 用于易忘, 小便滴沥, 腰酸腿痛, 关节痛。”	荜茇、干姜、黑胡椒、肉桂、余甘子(去核奶泡)、诃子(炒黄)、白花丹、粉防己、白皮松子仁、中亚白及、洋甘菊、奶桃各取 10 带尔海木, 葡萄干 30 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 加三倍量的蜂蜜制成蜜膏。口服, 一次 2~3 带尔海木。	蜜膏剂
维药方	5	买朱尼吾西拜	《卡拉巴丁艾再木》(公元 1785-1875 年, 穆哈穆德·艾扎木汗)“清除异常脾液质和异常黏液质, 治疗梅毒等。”	欧菝蓂根 5 托来, 诃子(炒黄)4 带尔海木, 毛诃子(炒黄)、西青果(炒黄)、地锦草、水龙骨、盒果藤根(除木芯)、菟丝草各取 5 带尔海木, 余甘子(奶泡)3 带尔海木, 番泻叶 10 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 加 3 倍量蜂蜜制成蜜膏。口服, 2~4 带尔海木。	蜜膏剂
维药方	6	艾比库克亚	《拜地依药书》(公元 1368 年, 再努勒·艾塔尔)“清除体内粘性体液, 明目。用于寒性头痛。”	芦荟(库西提)、苦艾浸膏、薰鲁香(醋制)各取 2 带尔海木, 司卡摩尼亚脂(库西提)、药西瓜(去籽和瓜藤)各取 1 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 用芹菜汁糅合制成丸。口服, 一次 1 带尔海木。	丸剂
维药方	7	艾比外吉吾里木法斯里	《提比艾克拜尔》(公元 1750 年, 穆哈穆德·艾克拜尔·艾尔扎尼)“治疗异常黏液质和异常胆液质混合所致关节疼痛。”	芦荟(库西提)1 带尔海木, 秋水仙(炒制)、诃子(炒黄)各取 1/2 米斯卡尔, 玫瑰花瓣、薰鲁香(醋制)各取 1/2 马夏。	药味研碎成细粉, 过筛, 用玫瑰花露制成鹰嘴豆大的丸。处方量为一次口服量。	丸剂
维药方	8	艾比赛比日	《拜地依药书》(公元 1368 年, 再努勒·艾塔尔)“治疗异常黏液质所致的头痛。”	芦荟(库西提)6 带尔海木, 薰鲁香(醋制)4 带尔海木, 盒果藤根(除木芯)2 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 制成鹰嘴豆大的丸。口服, 一次 10~14 粒, 睡前服用。	丸剂
维药方	9	买朱尼依比孜	《卡拉巴丁艾再木》(公元 1785-1875 年, 穆哈穆德·艾扎木汗)“善治易忘。”	水菖蒲、乳香、香附(库西提)各取 10 带尔海木, 干姜、黑胡椒各取 5 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 加 3 倍量蜂蜜制成蜜膏。口服, 1 大米斯卡尔。	蜜膏剂
维药方	10	买朱尼困都尔	《治疗方法》(公元 1887 年, 毛拉·麻合穆德艾克木)“用于尿滴症, 早泄。”	乳香、石榴花、橡子(略炒)、黑种草子(略炒)、芫荽子各取 10 米斯卡尔, 孜然(醋制)、阿育魏果(醋制)各取 5 米斯卡尔, 诃子(炒黄)、毛诃子(炒黄)、西青果(炒黄)、余甘子(取核奶泡)各取 3 米斯卡尔。	药味研碎成细粉, 过筛, 加 3 倍量蜂蜜制成蜜膏。口服, 一次 3 米斯卡尔。	蜜膏剂
维药方	11	买朱尼库木尼	《玉苏甫医学验方》(1282 年, 艾克木·乃斯如拉汗)“用于寒气所致腹胀胃痛。”	孜然(醋制)100 大米斯卡尔, 荜茇 30 大米斯卡尔, 干姜、薄荷各取 40 大米斯卡尔, 大青盐 10 大米斯卡尔。	药味研碎成细粉, 过筛, 加 3 倍量蜂蜜制成蜜膏。口服, 一次 1~2 大米斯卡尔。	蜜膏剂
维药方	12	苏福非提音	《医学之目的》(公元 1737 年, 穆拉德拜克·艾力拜克)“用于肠溃疡, 异常胆液质引起的腹泻。”	赤石脂、天竺黄、阿拉伯胶、罗勒子、淀粉、车前子各取 10 带尔海木。	除赤石脂、天竺黄、阿拉伯胶外, 罗勒子等三味炒黄, 均研碎成细粉, 过筛, 用玫瑰花露和玫瑰花油混合即可。口服, 一次 3 带尔海木~5 米斯卡尔。	散剂
维药方	13	艾比比乃非谢	《卡拉巴丁艾再木》(公元 1785-1875 年, 穆哈穆德·艾扎木汗)“清除脑内致病物质, 用于热性乃孜来、热性感冒。”	天山董菜、盒果藤根(除木芯)、甘草浸膏、玫瑰花瓣各取 1 带尔海木, 司卡摩尼亚脂、阿里红各取 1/2 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 用净水糅合制成丸。处方量为一次口服量。	丸剂
维药方	14	买朱尼艾非散厅	《药物精华》(公元 1833 年, 穆罕穆德·艾山)“缓解脾、肝寒性疼痛, 治疗肝性腹积水。”	茴芹果(略炒)、芹菜子(略炒)、苦艾、苦巴旦仁(去皮)各取等量。	药味研碎成细粉, 过筛, 加 3 倍量蜂蜜制成蜜膏。口服, 一次 2 带尔海木。	蜜膏剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
维药方	15	艾比苏阿力	《医学之目的》(公元1737年,穆拉德拜克·艾力拜克)“祛风,止咳。用于祖卡木,乃孜来,胸痛,气喘,咽喉肿痛。”	小茴香、甘草浸膏、黑胡椒、亚麻子(略炒)各取1米斯卡尔,巴旦仁(去皮)4米斯卡尔。	药味与白砂糖8米斯卡尔研碎成细粉,过筛,用蚤状车前子浸泡液糅合制成丸。口服,一次1米斯卡尔。	丸剂
维药方	16	苏福非萨纳木斯里	《药物之园》(公元1904年,穆罕默德·依明·塔孜胡尼)“用于坐骨神经痛。”	秋水仙(炒制)5带尔海木,番泻叶10带尔海木,白花丹2带尔海木,西红花1/2带尔海木。	药味研碎成细粉,过筛,与药味等量的白砂糖混匀即可。口服,3~5带尔海木。	散剂
维药方	17	艾比波瓦斯尔	《卡拉巴丁艾再木》(公元1785-1875年,穆哈穆德·艾扎木汗)“用于血液质性痔疮。”	小檗果膏4马夏,琥珀(库西提)、小豆蔻、赤石脂(煨制)、血竭、西青果(炒黄)、余甘子、天竺黄各取1马夏,穆库没药12马夏。	将穆库没药溶于韭菜汁,其余药材研碎成细粉,过筛,与上述药汁混合,制成鹰嘴豆大的丸。口服,4粒~3马夏。	丸剂
维药方	18	买朱尼阿提尔拉里	《卡拉巴丁艾再木》(公元1785-1875年,穆哈穆德·艾扎木汗)“治疗皮肤白病。”	驱虫斑鸠菊4马夏,阿纳其根、盒果藤根(除木芯)、干姜各取1达尼克。	药味研碎成细粉,过筛,加3倍量蜂蜜制成蜜膏。口服,一次7马夏。	蜜膏剂
维药方	19	罗欧克巴达木	《药物精华》(公元1833年,穆哈穆德·艾山)“滋润咽喉,用于咳嗽。”	巴旦仁(去皮)、葫芦子(略炒)各取5带尔海木,甘草浸膏、阿拉伯胶、西黄耆胶各取10带尔海木。	药味研碎成细粉,过筛,与甜巴旦油混合,将小麦淀粉10带尔海木和方糖2带尔海木放入玫瑰花露中溶解,趁热与药粉拌匀成膏。早晚适量舔服。	舔膏剂
维药方	20	苏福非塔巴西尔	《医学之目的》(公元1737年,穆拉德拜克·艾里拜克)“用于热性心脏气质失调。”	玫瑰花瓣、天竺黄各取3带尔海木,芫荽子2带尔海木,琥珀(库西提)、珊瑚(库西提)、珍珠(库西提)各取1/2带尔海木,樟脑(奶泡)1达尼克。	药味研碎成细粉,过筛即可。口服,一次2带尔海木。	散剂
维药方	21	艾比曼廷	《拜地依药书》(公元1368年,再努勒·艾塔尔)“用于寒性瘫病,面痹,大小关节痛,肌腱痛,肌腱松弛,腰痛,经堵症,尿堵症。”	骆驼蓬子(醋制)、阿莫尼亚脂、格蓬脂、穆库没药(库西提)、药西瓜(去籽和瓜藤)、芦荟(库西提)、盒果藤根(除木芯)各取5带尔海木,诃子(炒黄)75带尔海木。	以上8味,阿莫尼亚脂、格蓬脂、穆库没药用水溶解,其余五味研碎成细粉,过筛,倒入药液中,用葡萄醋糅合制成丸。口服,一次2马夏。	丸剂
维药方	22	依提尔非里欧斯提胡都斯	《卡拉巴丁艾再木》(公元1785-1875年,穆哈穆德·艾扎木汗)“异常黏液质、脾液质引起的头疼等脑病。”	诃子(炒黄)、西青果(炒黄)、毛诃子(炒黄)、余甘子(奶泡)、玫瑰花瓣、薰衣草、水龙骨、菟丝草、葡萄干各取等量。	药味研碎成细粉,过筛,与巴旦油混合,加3倍量蜂蜜制成蜜膏。口服,2米斯卡尔。	蜜膏剂
维药方	23	买朱尼依里提提	《拜地依药书》(公元1368年,再努勒·艾塔尔)“用于四日末热,害虫叮咬。”	阿魏(醋制)、黑胡椒、穆库没药(库西提)、芸香各取1带尔海木。	药味研碎成细粉,过筛,加3倍量蜂蜜制成蜜膏。口服,1~2带尔海木。	蜜膏剂
维药方	24	艾比晒比亚尔	《卡拉巴丁艾再木》(公元1785-1875年,穆哈穆德·艾扎木汗)“清除脑和胃内腐败的体液,用于头痛,眼蒙症。”	芦荟(库西提)5带尔海木,薰鲁香(醋制)、盒果藤根(除木芯)、诃子(炒黄)、苦艾各取1米斯卡尔,玫瑰花瓣、西黄耆胶各取1带尔海木。	以上7味,研碎成细粉,过筛,用玫瑰花露糅合制成黑胡椒大的丸。2带尔海木,睡前与温开水吞服。	丸剂
维药方	25	苏福非艾里勒	《医学之目的》(公元1737年,木拉德拜克·艾里拜克)“用于肝硬肿。”	诃子(炒黄)、西青果(炒黄)各取1米斯卡尔,芹菜子、茴芹果(略炒)、小茴香(略炒)各取4米斯卡尔。	药味研碎成细粉,过筛,混匀即可。口服,3带尔海木。	散剂
维药方	26	买朱尼外吉	《卡拉巴丁艾再木》(公元1785-1875年,穆罕默德·艾再木汗)“善治膀胱寒虚所致尿滴症。”	乳香、新疆圆柏果(炒制)、香附、阿育魏果(醋制)、甘草浸膏各取1倍,水菖蒲2倍。	药味研碎成细粉,过筛,加白砂糖制备成蜜膏。睡前取榛子大小服用。	蜜膏剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
维药方	27	朱瓦日西赞吉比力	《医学之目的》(公元 1737 年, 木拉德拜克·艾里拜克)“散气, 助消化。用于消化不良性腹泻。”	干姜 20 带尔海木, 阿拉伯胶及小豆蔻各取 10 带尔海木, 丁香及肉桂各取 5 带尔海木, 肉豆蔻(清炒)及西红花各取 1 带尔海木。	除西红花外, 其余药味研碎成细粉, 过筛, 将西红花研碎成细粉, 与药粉和淀粉 42 带尔海木混合, 加冰糖 100 带尔海木制成蜜膏。口服, 一次 2 带尔海木。	粗粉膏
维药方	28	艾比罗里维	《药物精华》(公元 1833 年, 穆罕穆德·艾山)“补心益脑, 用于肝源性黄病和热性心悸病。”	玫瑰花瓣 2 带尔海木, 天竺黄、珍珠(库西提)、珊瑚(库西提)、檀香各取 1 带尔海木, 黄瓜子(干炒)、葫芦子(干炒)各取 5 带尔海木, 马齿苋子(干炒)、西红花各取 1/2 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 用蚤状车前子浸泡液糅合制成丸, 晾干即可。口服, 一次 1 大米斯卡尔。	丸剂
维药方	29	买朱尼木来引	《卡拉巴丁艾再木》(公元 1785-1875 年, 穆哈穆德·艾扎木汗)“用于习惯性便秘。”	天山董菜、睡莲花、玫瑰花瓣、盒果藤根(除木芯)各取 10 带尔海木, 刺糖 30 带尔海木, 葡萄干 1/2 热提里。	刺糖溶在玫瑰花露中, 滤过, 其余药味研碎, 过筛, 巴旦油混合, 加蜂蜜制成蜜膏。口服, 一次 2~5 带尔海木。	蜜膏剂
维药方	30	依提日非里赛合尔	《医学之目的》(公元 1737 年, 木拉德拜克·艾里拜克)“软化大便, 清除胃内胆液质。”	诃子(炒黄)、毛诃子(炒黄)、余甘子(去核奶泡)、地锦草各取 10 带尔海木, 甘草、玫瑰花瓣各取 5 带尔海木, 盒果藤根(除木芯) 20 带尔海木, 肉桂 4 带尔海木, 干姜、白花丹各取 3 带尔海木, 小豆蔻 2 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 加蜂蜜适量制成蜜膏。口服, 4 带尔海木。	蜜膏剂
维药方	31	艾比阿亚热吉	《拜地依药书》(公元 1368 年, 再努勒·艾塔尔)“用于各种寒性疾病, 清除胃滞腐败体液质。”	芦荟(库西提)、盒果藤根(除木芯)各取 1 带尔海木, 牵牛子(略炒)、茴芹果(略炒)、阿里红各取 1/2 带尔海木, 大青盐(库西提)1/4 带尔海木, 药西瓜(去籽和瓜藤)1/6 带尔海木。	药味研碎成细粉, 过筛, 用小茴香浸泡液、或用蜂蜜或白砂糖糅合制成鹰嘴豆大的丸。口服, 一次服用 1 个处方量。	丸剂
维药方	32	买朱尼金提亚纳	《药物精华》(公元 1833 年, 穆罕穆德·艾山)“开通阻滞, 用于肝、脾硬肿, 缓解胃痛、肾痛及膀胱痛。”	欧龙胆(库西提)、黑胡椒各取 10 带尔海木, 木香(库西提)、三条筋、甘松、大黄各取 7 米斯卡尔。	药味研碎成细粉, 过筛, 加 3 倍蜂蜜制成蜜膏。口服, 一次 2 带尔海木。	蜜膏剂
维药方	33	木尼孜其白朶木	《米扎尼·提比》(公元 1871 年, 穆罕默德·阿克拜尔·艾尔扎尼)“成熟异常黏液质, 主治各种异常黏液质性疾病。”	葡萄干 12 粒, 小茴香(略炒)2 带尔海木, 甘草(去皮)3 带尔海木, 大蓟(略碎)2 带尔海木, 铁线蕨 5 带尔海木, 无花果干 5 个, 玫瑰花瓣 3 带尔海木。	药味加水浸泡、煎煮至三分之一药液, 滤过, 药液加蜂蜜 7 带尔海木。温服。	汤剂
维药方	34	木尼孜其赛甫拉	《米扎尼·提比》(公元 1871 年, 穆罕默德·阿克拜尔·艾尔扎尼)“成熟异常胆液质, 用于各种异常胆液质性疾	天山董菜、睡莲花、地锦草、菊苣根、玫瑰花瓣各取 2 带尔海木, 菊苣子(略炒)7 带尔海木, 圆枣 7 粒。	药味加水浸泡、煎煮至三分之一药液, 滤过。温服。	汤剂
维药方	35	木尼孜其赛吾达	《米扎尼·提比》(公元 1871 年, 穆罕默德·阿克拜尔·艾尔扎尼)“成熟异常脾液质, 主治各种异常脾液质性疾	破布木果 20 个, 圆枣 10 个, 牛舌草、香青兰、薰衣草、铁线蕨、小茴香(略炒)、地锦草各取 2 带尔海木, 甘草(去皮)3 带尔海木。	药味加水浸泡, 煎煮至三分之一药液, 滤过, 药液加适量糖。温服。	汤剂
维药方	36	木斯力白朶木	《米扎尼·提比》(公元 1871 年, 穆罕默德·阿克拜尔·艾尔扎尼)“清除异常黏液质, 用于各种异常黏液质性疾	破布木果、圆枣各取 20 个, 神香草、睡莲花、	药味加水 3 热体力, 煎煮至三分之一药液, 滤过, 加阿勃勒、刺糖、玫瑰花糖	汤剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			病。”	天山董菜、铁线蕨、小茴香(略炒)各取3带尔海木,去核葡萄干15带尔海木,无花果干7个,甘草(去皮)4带尔海木,阿勃勒、刺糖、玫瑰花糖膏各取10带尔海木。	膏,搅拌,浸泡,滤过,再加巴旦木仁油1带尔海木。温服。	
维药方	37	木斯力赛甫拉	《米扎尼·提比》(公元1871年,穆罕默德·阿克拜尔·艾尔扎尼)“清除异常胆液质,用于各种异常胆液质性疾病。”	诃子(炒黄)6带尔海木,欧李15个,破布木果20个,番泻叶、地锦草各取3带尔海木,菊苣子(略炒)2带尔海木,圆枣9枚,菟丝草1.5带尔海木,刺糖取至15带尔海木。	药味加水,煎煮至二分之一药液,滤过,刺糖浸泡,滤过,再加适量巴旦木仁油。温服。	汤剂
维药方	38	木斯力赛吾达	《卡拉巴丁卡地日》(公元1780年,穆罕默德·阿克拜尔·艾尔扎尼)“清除异常脾液质,主治各种异常脾液质性疾病。”	玫瑰花瓣、番泻叶各取40马夏,天山董菜80马夏,盒果藤根(除木芯)、苦艾、阿里红各取20马夏,菟丝草、薰衣草、薰鲁香(醋制)各取12马夏,甘松10马夏,圆枣30粒,破布木果30粒。	药味加1800马夏量水,浸泡一昼夜,煎煮至剩四分之一药液,滤液加刺糖675马夏或白砂糖。一次22~45马夏,温服。	汤剂
傣药方	1	雅解匹勒	《档哈雅塔都档细》(方剂应用历史约1500年)“用于防治拢匹勒(月子病-妇女产后疾病)和全身酸软无力,面黄体瘦。”	长柱山丹、人字树、竹叶兰、粗叶木各5两,定心藤3两5钱。	诸药共加水2瓢煎煮,浓缩至半瓢备用。口服,每次1盅,每日3次。	汤剂
傣药方	2	雅朋勒	《档哈雅道香嫩》(方剂应用历史约900余年)“用于治疗胃痛,脘腹肋助胀痛,呕吐,腹泻。”	姜黄、紫色姜、藏菖蒲、山大黄、艾叶各等量。	诸药混合舂成细粉,过筛拌匀,装好备用。口服,用温开水送服,每次1钱,每日3次。	散剂
傣药方	3	雅喃菲埋喃皇罗巴呢	《档哈雅贺理》(方剂应用历史500余年)“用于治疗烧烫伤。”	余甘子树皮、多依树皮、千张纸树皮、山大黄各6两5钱,芦荟2钱,冰片6钱。	水煎煮,浓缩备用。外用,清洁创面后,取药液涂擦或湿敷患处。	外用洗剂
傣药方	4	雅巴他文巴帕底滚	《档哈雅勐傣》(方剂应用历史1000余年)“用于治疗外感发热或寒热往来,或畏寒肢冷,发热,患热病经久不愈,风邪游走串周身,遍体疼痛;乳房包块肿痛;拢阿麻木(热风手足发热疼痛或见周身冰冷僵硬);拢麻想乎(热风咽喉痛);拢沙龙很(热风挟痰涎上壅);石淋、沙淋;全身发黄,外伤肿痛;沙龙菲(皮肤红肿热痛),沙龙勒(咽喉红肿热痛,流脓流血);风火牙痛,耳道流脓,兵捧(脓性指头炎),麻想(热毒疮)。”	苦藤、青牛胆各等量。	诸药共碾细粉备用。口服,每次2钱,每日3次。外用适量。	散剂
傣药方	5	雅板先拢	《档哈雅龙》(方剂应用历史1200余年)“用于治疗风邪上行颈项而致的头昏头痛,胸闷心悸,失眠,食欲不振,腹胀欲呕。”	南板蓝根、早莲草、火焰花、鱼眼草各1两2钱,黑种草子粉的量为前四味药总重量的三分之一。	诸药共碾细粉备用。口服,每次2钱,每日3次。用温开水送服。外用适量。	散剂
傣药方	6	雅解占拉	《档哈雅龙》(方剂应用历史1500余年)“用于治疗拢呆坟(中风偏瘫、半身不遂),耳聋,心胸疼痛,尿血、尿石症,面黄肌瘦,腹部胀痛。”	姜黄、紫色姜各2两5钱,黑种草子、小姜各8钱。	诸药共碾细粉备用。口服,每次2钱,每日3次。外用适量。	散剂
傣药方	7	雅鲁郎因	《档哈雅龙》(方剂应用历史600余年)“用于治疗沙尼坝(热风病),麻想乎(皮肤斑疹疮),拢赶谢(各种痛症),拢沙入(突然昏仆,双目发黑,牙关紧闭)。”	山大黄、黑种草子各等量。	二药共碾细粉,用早莲草汁调匀,搓成小药丸备用。口服,每次1~3丸,每日3次。	丸剂
傣药方	8	雅瓦几腊扁	《档哈雅沙巴帕雅》(方剂应用历史1000余年)“用于治疗害闹(冷热病),接恩些罕(胸肋刺痛),拢达郎、	姜1两5钱,清明花5钱,紫色姜1两5钱,早莲草汁适量。	诸药共碾细粉,加入早莲草汁拌匀后用水泛丸,每丸重约1颗红豆,干燥备用。	丸剂

批次	序号	方名	原文			剂型
			出处	处方	制法及用法	
			松搗、呆勒（头晕目眩，双目发黑，突然昏倒，不省人事）。”		口服，每次1~3丸，每日3次。以盐水为引，调于温开水送服。	
傣药方	9	雅帕纳来	《档哈雅龙》（方剂应用历史1500余年）“用于治疗患病后不知冷热痛痒，恶心欲呕，全身发黄，肢体酸痛，口苦；或见食欲不振，手足疼痛，屈伸不利，口角歪斜，双目上翻，全身颤抖，二阴出血，口苦咽干，恶心欲呕；食物中毒，大毒疮，腹内生疮，咳喘病，咽喉肿痛，九窍流血，犬咬伤，蜈蚣、毒蛇咬伤，周身刺痛，结石病，小便热涩疼痛。”	卵叶巴豆根5两，黑种草子8钱。	二药共碾细粉，用早莲草汁调匀，搓成小药丸，再取粉芭蕉叶包好，置于火塘架上至药丸干燥备用。口服，每次3~6丸，每日3次。外用适量。	丸剂
傣药方	10	雅哈拢	《档哈雅龙》（方剂应用历史1500余年）“用于治疗各种风病、肢体酸麻胀痛等。”	黑种草子2钱，竹叶兰、山大黄各5钱。	诸药共碾细粉，用早莲草汁调匀搓成小药丸备用。口服，每次3~6丸，每日3次。	丸剂
傣药方	11	雅西里勐腊嘎罕囡	《档哈雅龙》（方剂应用历史1000余年）“用于治疗沙尼坝（热风病）头晕目眩，眼目发红，头痛欲裂，手足颤抖，神倦肢懒或高热抽风；拢呆坟（中风病）突然昏仆，不省人事；心慌心跳，烦躁不安；咳嗽等病症。”	榼藤子仁8钱，卵叶巴豆叶3钱，蔓荆叶1两，胡椒2钱。	诸药共碾细粉，加入早莲草汁调匀搓成小药丸备用。口服，每次3~6丸，每日3次。外用适量。	丸剂
傣药方	12	雅叫尾先啊郎干	《档哈雅扎雅尚嘎哈》（方剂应用历史1300余年）“用于治疗心胸闷胀，脘腹疼痛；男、女阴部疮疡溃烂；全身起硬疔及包块、肿物，头昏头晕，周身困乏，动则手足酸痛；水肿；呕吐；睾丸肿痛；咽干口苦，久病不愈。”	山柰、小红蒜、苦菜子、蔓荆子、藏菖蒲、大蒜、紫色姜各等量。	诸药共碾细粉，加少量紫色姜粉为引，用蜂蜜调匀搓成小药丸。口服，每次3~6丸，每日3次。外用适量。	丸剂
傣药方	13	雅拢旧短嘎	《档哈雅贺埋》（方剂应用历史500余年）“用于胃脘胀痛，恶心呕吐，妇女经来腹痛，周身肌肉、关节痉挛疼痛，屈伸不利等。”	姜黄、紫色姜、藏菖蒲、姜、茴香豆蔻、香樟树根各4钱，胡椒1钱，阿魏适量为引。	诸药共碾细粉备用。口服，每次2钱，每日3次。温开水送服。	散剂
傣药方	14	雅接短	《档哈雅勐傣》（方剂应用历史1000余年）“用于治疗食滞中盘，脘腹胀痛，噎腐吞酸，胃肠中灼热疼痛或痉挛剧痛等病症。”	姜黄、紫色姜、藏菖蒲、艾叶各3两5钱，山乌龟1两5钱，早莲草、莪术5两。	诸药共碾细粉备用。口服，每次2钱，每日3次。	散剂
傣药方	15	雅旧勒(止血散)	《档哈雅塔都档细》（方剂应用历史1500年）“用于治疗各种出血，如二便出血、胃出血、鼻出血、齿出血、崩漏不止等病症。”	火焰花、板蓝根、冰片叶、艾叶、早莲草、马蹄金、酢浆草各2斤，黑种草子1两。	诸药共碾细粉备用。口服，每次2钱，每日3次，开水送服。	散剂
傣药方	16	雅瓦鲁塔专	《档哈雅道香嫩》（方剂应用历史900余年）“用于治疗风湿病全身酸痛，脘腹胀痛，头晕头痛。”	黑种草子、姜黄各1斤，紫色姜、胡椒各3两。	诸药晒干后舂成细粉，拌匀，加早莲草汁泛丸，每丸重约1克。口服，每次3~4丸，每日3次，用温开水送服。	丸剂
傣药方	17	雅拢章说标	《档哈雅康朗罕》（方剂应用历史300余年）“用于治疗中风、口眼歪斜等。”	榼藤子仁、胡椒、姜各3钱。	先取榼藤子仁炒微黄致熟，然后取上诸药混合碾细粉备用。口服，每次1钱，每日3次，用开水冲服。	散剂
傣药方	18	雅帕然兵比河	《档哈雅康朗罕》（方剂应用历史300余年）“用于治疗久病多汗。”	赧桐根、倒心盾翅藤、圆锥南蛇藤各等量。	诸药共碾细粉备用。口服，每次2钱，每日3次，用米汤调服。	散剂

① 古籍原文无煎服法，据现代教材补“水煎服”。

② 古籍原文无煎服法，据现代教材补“水煎服”。

第一批：<http://www.natcm.gov.cn/kejisi/zhengcewenjian/2018-04-16/7107.html>

古代经典名方目录(第一批)

第二批：<http://www.natcm.gov.cn/kejisi/gongzuodongtai/2023-09-01/31743.html>

1. 古代经典名方目录(第二批)-汉族医药

2. 古代经典名方目录(第二批)-藏医药

3. 古代经典名方目录(第二批)-蒙医药

4. 古代经典名方目录(第二批)-维医药

5. 古代经典名方目录(第二批)-傣医药